

Über die Spannungsreihe positivierter Äthylene.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Von

GEORG LÄUFER

aus Bochum.

Bonn 1938
Anton Brand.

Referent: Professor Dr. R. Wizinger.
Korreferent: Professor Dr. Dr. h. c. P. Pfeiffer.



*Dem Andenken meines Vaters.
Meiner lieben Mutter.*

Vorliegende Arbeit wurde am Chemischen Institut der Universität in Bonn ausgeführt.


Meinem verehrten und hochgeschätzten Lehrer, Herrn Professor Dr. R. W i z i n g e r, spreche ich für sein unermüdliches Interesse, mit dem er den Fortschritt dieser Arbeit förderte und für seine zahlreichen Anregungen meinen ehrerbietigsten Dank aus.

Theoretischer Teil.

Das Tetraphenyläthylen hat bekanntlich nur ein sehr geringes Additionsvermögen. Jod und Brom werden überhaupt nicht mehr addiert, Chlor nur unter besonderen Vorichtsmaßregeln. Doch auch hier ist die Bindung so locker, daß beim Erhitzen über den Schmelzpunkt das Tetraphenylchloräthan wieder in seine Komponenten zerfällt. Diese Verbindung besitzt die Eigenschaften eines normalen nichtionoiden Äthan-Derivates. Sie ist farblos, löslich in organischen Lösungsmitteln wie Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Äther, unlöslich dagegen in Wasser.

Die Einführung positiver Gruppen ($\text{CH}_3\text{O}-$, $\text{HO}-$, $\text{H}_2\text{N}-$, $(\text{CH}_3)_2\text{N}-$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N}-$, Ringeschluß durch O , S , RN) ändert das Bild nun wie folgt:

Die beiden Äthylenkohlenstoffatome werden befähigt, negative Reste zu addieren, und zwar nicht mehr nichtionoid, d. h. unmittelbar am Kohlenstoff, sondern ionoid. Es entstehen also ionisierte Verbindungen mit Salzcharakter, die in Wasser löslich, in Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Äther dagegen unlöslich sind. Sie enthalten zwei koordinativ ungesättigte, ioneide Kohlenstoffatome, kurz: es werden Dicarbeniumsalze erhalten.



Diese Verbindungen sind sämtlich tieffarbig, da sie zwei Carbeniumchromophore in Verbindung mit Arylgruppen und positiveren Auxochromen enthalten. ¹⁾

Je stärker man das Äthylen positiviert, um so leichter findet der Übergang in ein Dicarbeniumsalz statt und umso größer ist die

1) W. Dilthey, J. pr. (2) 109, 273 ff. (1925). R. Wizinger u. J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928. R. Wizinger u. W. Brunnert, Dissertation Bonn 1930.

Ionenbeständigkeit und damit die Hydrolysefenechtheit der Farbsalze. Elektrochemisch verhält sich ein positiviertes Äthylen wie ein schwach positives zweiwertiges Metall. Einem stärker positivierten Äthylen entspricht ein stärker positives zweiwertiges Metall, einem schwächer positivierten Äthylen ein entsprechend schwächer positives Metall, sodaß man analog der Spannungsreihe der Metalle von einer

Spannungsreihe der Äthylene

sprechen kann.²⁾

Daraus müßte sich die Folgerung ergeben, daß nicht nur stärker elektropositive Metalle, sondern auch positivierte Äthylene schwächer elektropositive Metalle aus ihren Salzen verdrängen können. Gegenstand vorliegender Arbeit war es nun, die Richtigkeit dieses Gedankenganges zu prüfen.

Zu der Untersuchung wurden folgende Äthylene herangezogen: Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen, Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen, Tetraaminotetraphenyläthylen, Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen, Tetramethoxytetraphenyläthylen, Tetraoxytetraphenyläthylen, Dixanthylen, Thiodixanthylen und Tetraphenyläthylen. Sie wurden in Reaktion gebracht mit: Silberperchlorat, Silbernitrat, Ferrichlorid, Mercurichlorid, Kupferchlorid, Kupfernitrat und Kupfersulfat.

Das Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen wurde dargestellt durch Reduktion des Tetraäthyldiaminobenzophenons mit Stanniol in rauchender Salzsäure.³⁾ Dieses Äthylen ist durch die vier Diäthylaminogruppen so stark positiviert, daß es sich schon an der Laboratoriumsluft durch Farbsalzbildung dunkel färbt.

Das Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen läßt sich in entsprechender Weise aus Michlerschem Keton gewinnen. Es wurde mir von Herrn Prof. Dr. R. W i z i n g e r zur Verfügung gestellt. Auch

2) Ausgehend von zum Teil verwandten Gedankengängen spricht R. Weitz von einer Spannungsreihe der Triphenylaminderivate. Vgl. B. 59, 2307 (1926).

3) R. Wizinger u. R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, Seite 42.

bei diesem Äthylen bewirkt die starke Positivierung schon eine große Empfindlichkeit gegen die säurehaltige Laboratoriumsluft.

Nach den Angaben von R. Knipp⁴⁾ wurde das Tetraaminotetraphenyläthylen durch Reduktion des Tetranitrotetraphenyläthylens mit Zinnchlorür und Salzsäure gewonnen. Die Herstellung des Tetranitrotetraphenyläthylens wurde ebenfalls in Anlehnung an die Arbeiten von R. Knipp⁵⁾ durch Nitrieren des Tetraphenyläthylens dargestellt, doch konnte durch Änderung dieser Methode die Ausbeute von 35% (bei Knipp) auf 55% an reinem Äthylen gesteigert werden. Bezüglich der Einzelheiten sei auf den experimentellen Teil verwiesen. Die Reduktion dieses reinen Tetranitrotetraphenyläthylens lieferte reines Amin in 97%iger Ausbeute.

Das Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen wurde nach R. Willstätter und M. Goldmann⁶⁾ durch Reduktion des p-Dimethylaminobenzophenons mit Stanniol und rauchender Salzsäure gewonnen. Die beiden Dimethylaminogruppen bedingen ebenfalls eine starke Positivierung, sodaß auch dieses Äthylen schon an der Laborluft Farbfalze (rot) zu bilden vermag.

Das Tetraoxytetraphenyläthylen wurde zuerst nach A. Behr⁷⁾ aus dem Baryumsalz der Tetraphenyläthylentetrafulfosäure durch Alkalischmelze gewonnen. Die Ausbeuten nach diesem Verfahren sind jedoch so gering — nur ganz wenige Prozent —, daß versucht wurde, das Äthylen auf einem andern Wege darzustellen. Es lag der Gedanke nahe, das nun gut zugängliche Tetraaminotetraphenyläthylen als Ausgangsprodukt zu nehmen, es zu diazotieren und dann zu verkochen. Dabei stellte sich jedoch heraus, daß ein Diazotieren aller vier Aminogruppen unter den üblichen Bedingungen nicht erreicht werden kann. Nach dem Verkochen des diazotierten Produktes wurde ein brauner Körper erhalten, der mit dem Tetraoxytetraphenyläthylen nichts gemein hatte. Vermutlich war nur ein Teil der Aminogruppen durch Oxygruppen ersetzt worden. Ein befriedigen-

4) R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, Seite 42.

5) Desgl. Seite 37.

6) B. 39, 3768 (1906).

7) B. 5, 277 (1892).

der Erfolg konnte aber durch Entmethylierung von Tetramethoxytetraphenyläthylen mit Aluminiumbromid in Benzol erzielt werden. Wenn die Ausbeute auch durch Kondensationsprodukte des Äthylens mit dem Lösungsmittel Benzol geschmälert wird (siehe auch W. L o e w e, Dissertation Bonn 1936, Seite 15), so ist sie doch in Hinsicht auf die schlechten Ausbeuten nach dem „Behr'schen“ Verfahren immer noch recht gut. Durch zweimaliges Umkristallisieren aus Eisessig konnte ein recht reines Äthylen in einer Ausbeute von 33% erhalten werden.

Dixanthylen wurde nach den Angaben von v. Konstanteeky⁸⁾ durch Reduktion von Xanthon mit Zinkstaub in Eisessig dargestellt, das Xanthon selbst nach W. Perkin⁹⁾ durch Destillation von Salicylsäure mit Essigsäureanhydrid.

Durch Reduktion von Thioxanthon nach F. Mayer¹⁰⁾ mittels Zinkstaub in Essigsäure wurde das Thiodixanthylen gewonnen. Das Thioxanthon selbst ist leicht zugänglich durch Kondensation von Thiofalsicylsäure mit Benzol und konzentrierter Schwefelsäure.¹¹⁾

Das Tetraphenyläthylen endlich stellte ich dar nach J. H. Ziegler^{11a)} durch Reduktion von Diphenylmethan mit Schwefel. Die Ausbeute ist zufriedenstellend.

Die Untersuchungen begannen bei dem am stärksten positivierten Äthylen, dem Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen. Wird dieses in der Kälte in Eisessig mit Silberperchlorat (1 Mol Äthylen mit zwei Molen Silberperchlorat) zur Reaktion gebracht, so findet folgende merkwürdige Umsetzung statt: Aus der blaßgrünen Lösung scheiden sich fast quantitativ zwei Mole Silberacetat aus. Mit Äther kann aus der Flüssigkeit ein blaßgrüner Körper gefällt werden, der ziemlich explosiv ist. Mit alkoholischem Kali wird dieser in Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen und Kaliumperchlorat aufgespalten. Es liegt also das Perchlorat des Äthylens vor, bei dem die Über-

8) B. 28, 2310 (1895).


9) B. 16, 339 (1883).

10) B. 42, 1134 (1909); C. 1909, 1573.

11) Journ. Chem. Soc. 97, II, 1296 (1910).


11a) B. 21, 780 (1888).

chlorfäure ammoniumfalzartig an die Diäthylaminogruppen gebunden ist. In der Kälte findet also noch keine Entladung des Silberions statt, vielmehr haben wir es hier mit einer doppelten Umsetzung zu tun, wobei das am schwersten lösliche Salz auskristallisiert. Der Vorgang entspricht folgendem Formelbild:




Dieses Ergebnis beweist, daß in der Eiseßiglösung des Äthylens zumindest bis zu einem gewissen Gleichgewicht das Ammoniumacetat des Äthylens vorhanden sein muß.

Erst in der Hitze nimmt das Äthylen die elektrische Ladung des Silberions auf und bildet mit dem negativen ClO_4 -Ion das tief-farbige Perchlorat. Erwärmt man die Lösung von Äthylen und Silberperchlorat in Eiseßig oder besser in Alkohol, so schlägt die blaß-grüne Farbe rasch in sehr intensiv blau-violett um und metallisches Silber fällt aus (2 Atome). Beim Erkalten scheidet sich das Farbsalz in schön goldig-grün glänzenden Kriställchen aus. Es erweist sich als identisch mit dem von R. Knipp¹²⁾ auf anderem Wege dargestellten Oktaäthyltetraaminotetraphenyldicarbeniumperchlorat. Das Äthylen verhält sich hier also tatsächlich wie ein Metall, das elektro-positiver ist als Silber:




12) R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, Seite 24.



Beim Umsatz mit Silbernitrat wurde das Silber vom Äthylen ebenfalls unter Bildung des tief blau-violetten Farbfalzes verdrängt. Es gelang nicht, das Dicarbeniumnitrat kristallin zu erhalten; immerhin konnte fein Vorhandensein durch doppelten Umsatz zum Perchlorat nachgewiesen werden.

Das Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen vermag auch Ferriionen zu Ferroionen zu reduzieren:




Das Dicarbeniumchlorid bildet mit überschüssigem Eisenchlorid sofort das Eisenchloriddoppelsalz, welches aus der Lösung der Komponenten in goldroten Kristallen erhalten werden kann.

Analog wie mit Silberperchlorat reagiert das Äthylen in der Kälte in Eisessig mit Kupferchlorid, Kupfernitrat und Kupfersulfat. Das verhältnismäßig schwer lösliche Kupferacetat scheidet sich aus, die überstehende blaß-grüne Lösung enthält das entsprechende Ammoniumsalz des Äthylens. Diese Ammoniumsalze lassen sich mit Äther ausfällen.

Der Umsatz in der Hitze führt beim Kupferchlorid zum Dicarbeniumchlorid:





Das Dicarbeniumchlorid ist in Wasser leicht löslich mit der typischen blau-violetten Farbe. In festem Zustand bildet es sehr schöne goldig grün-glänzende Kristalle vom Smp. 178/181°. Dieses Farbsalz war auch schon von R. Knipp aus dem Äthylen und Chlor erhalten worden, allerdings nicht in reinem Zustand.


Mit Kupfernitrat bildete sich das ebenfalls tief blau-violette Dicarbeniumnitrat. Es wurden auch schön grün-goldene Kristalle gefaßt, die sich jedoch bei der Analyse als das Diacetat und nicht als das Dinitrat erwiesen. (Der Umsatz war in Eisessig vorgenommen worden.) Bei dem Versuch scheiden sich geringe Mengen von metallischem Kupfer ab. Es ist nicht anzunehmen, daß das Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen einen so stark positiven Charakter zeigt, daß es das Cuprifalz bis zum metallischen Kupfer reduziert. Vielmehr wird die Reduktion nur bis zur Cupro-Stufe geführt haben, die dann, wie es bei Cuprosalzen, besonders in konzentrierten Lösungen, leicht eintritt, in Cuprifalz und metallisches Kupfer disproportionieren. Dafür, daß die Reduktion nur bis zum Cupronitrat geführt haben kann, spricht weiterhin die Tatsache, daß aus Farbsalzen durch Schütteln mit Ullmannkupfer in Chloroform die entsprechenden Äthylene zurückgewonnen werden können.¹³⁾ Silber gibt diesen Effekt nicht, was ja auch ganz erklärlich ist, da es selbst aus seinen Salzen durch Äthylen verdrängt wird.

Ganz entsprechenden Verhältnissen begegnen wir beim Kupfersulfat. In der Wärme tritt die Farbsalzbildung ein. Das Dicarbeniumsulfat jedoch konnte nicht in kristallisiertem Zustand gefaßt werden, doch wurde es durch doppelten Umsatz zum Perchlorat einwandfrei nachgewiesen. Auch bei dieser Umsetzung wurde metallisches Kupfer beobachtet. Es ist ebenfalls auf eine Disproportionierung des durch die Reduktion erhaltenen Cuprosulfats in Cupri-

¹³⁾ R. Wizinger, B. 60, II, 1387. J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928, Seite 22.

fulfat und metallisches Kupfer zurückzuführen. Eine Reduktion bis zum metallischen Kupfer ist auch hier recht unwahrscheinlich.

Essigsaure Lösungen von Mercurichlorid und Äthylen zeigen in der Kälte den auch schon bei den Silber- und Kupfersalzen beobachteten doppelten Umsatz. Man erhält Mercuriacetat und das salzsaure Salz des Äthylens, aus welchem durch Abspalten der Salzsäure mit alkoholischem Alkali das Äthylen wieder erhalten werden kann. Das violette Farbsalz bildet sich wieder erst in der Hitze. Metallisches Quecksilber scheidet sich nicht aus, das Mercurion wird zu Mercuroion reduziert. Andererseits entsteht das Dicarbeniumchlorid, welches auch als solches gefaßt werden kann:




Die bei den Umsetzungen in der Kälte gewonnenen Ammoniumsalze sind sowohl im festen Zustand wie in Lösung lichtempfindlich. Beim Bestrahlen mit ultraviolettem Licht färben sie sich in kurzer Zeit intensiv blau-violett. (Bildung der Dicarbeniumsalze.) Unbelichtet sind sie dagegen durchaus beständig.

Beim Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen wurden im Großen und Ganzen die gleichen Ergebnisse erzielt wie beim Oktäthyltetraaminotetraphenyläthylen. Die beiden Äthylene stehen sich hinsichtlich der Positivierung ja auch recht nahe. Mit Silberperchlorat wird unter Abscheidung von zwei Molen atomaren Silbers das Dicarbeniumperchlorat erhalten. Die Verbindung läßt sich aus heißem Eisessig in kristalliner Form erhalten und bildet Kristalle mit stark grünem Oberflächenglanz. Zersetzungspunkt etwa 325°. Seine Löfungsfarbe ist tief blau-violett.

Beim Arbeiten in Anisol gelingt es, daneben einen zweiten,

blauen Körper in geringer Menge zu isolieren, der ein ganz anderes Spektrum zeigt als das Diperchlorat. Auch mit dem Spektrum des Tetramethyldiaminodiphenylcarbinols in Eisessig zeigt es keine Übereinstimmung. Der Körper ist wesentlich schwächer explosiv als das oben besprochene Perchlorat und dürfte wohl nur ein ClO_4 -Ion enthalten. Eine genaue Untersuchung dieser Verbindung mußte aus Substanzmangel unterbleiben. Vielleicht liegt ein Ammeniumsalz vor:



Über diese eigenartige Gruppe von Farbsalzen wird weiter unten noch zu sprechen sein.

Der Umsatz des Äthylens mit Silbernitrat führt zu einem blau-violetten Farbsalz, dem Dicarbeniumnitrat, welches aus heißem Alkohol in schön kristalliner Form gewonnen werden kann. Das Silber wird hierbei ebenfalls als Metall abgechieden. Man kann also auch hier von einer Verdrängung des Silbers aus seinem Salz durch das stärker positive Äthylen sprechen.

Wie das Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen bildet auch das Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen mit Ferrichlorid ein Doppelsalz, welches das Ion $(\text{FeCl}_4)^-$ enthält. Der Nachweis des Eisens in dieser Verbindung gelingt bemerkenswerterweise nur, wenn man mit Schwefelsäure abraucht, dann in Salzsäure aufnimmt und wie üblich die Berliner-Blau-Probe macht.

Mercurichlorid und Cuprichlorid zeigen ebenfalls die nämlichen Erscheinungen wie beim Umsatz mit Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen. Es entsteht in beiden Fällen das tief violett-blaue Farbsalz, das aus Eisessig, bzw. Alkohol in sehr schönen Kristallen erhalten wird.

Mit Kupfernitrat und Kupfersulfat führt der Umsatz des Äthylens ebenfalls zu den entsprechenden Farbsalzen, doch konnten beide nicht in kristalliner Form erhalten werden. Es steht jedoch

außer Zweifel, daß sich das Dicarbeniumnitrat bzw. -sulfat bilden, denn in beiden Fällen läßt sich durch bloßen doppelten Umsatz mit Natriumperchlorat das Dicarbeniumperchlorat in der erwarteten Menge abscheiden.

Die Ergebnisse der Untersuchung beim Tetraaminotetraphenyläthylen schließen sich wiederum eng an die Ergebnisse bei den beiden vorher besprochenen Äthylenen an. Die vier im Äthylen enthaltenen Aminogruppen üben eine immerhin noch so starke positivierende Wirkung aus, daß hinsichtlich des Verhaltens gegen Metallsalze kaum Unterschiede festzustellen sind.

Auf den ersten Blick erscheint die Farbe der Tetraaminotetraphenyldicarbeniumsalze unverständlich. Sie ist nämlich tiefgrün, während die Dicarbeniumsalze mit vier Dimethyl- bzw. Diäthylaminogruppen blau-violett sind. Der Ersatz durch Aminogruppen bringt also hier einen starken hypsochromen Effekt hervor. Dies widerspricht völlig den bisherigen Erfahrungen. Farbsalze mit Dimethylaminogruppen sind stets tieferfarbig als solche mit Aminogruppen. Es sei nur hingewiesen auf das Beispiel: Parafuchsin (blaurot) und Kristallviolett. Die genaue spektroskopische Untersuchung der Farbsalze der Dicarbeniumreihe hat nun ergeben, daß nur für unser Auge, nicht aber im physikalischen Sinne ein hypsochromer Effekt vorliegt. Das Farbsalz mit vier Aminogruppen absorbiert im langwelligen Rot; das Absorptionsmaximum liegt bei 730μ . Die Farbsalze mit vier Dimethylaminogruppen und mit vier Diäthylaminogruppen besitzen je eine Absorptionsbande, die im langwelligen Rot beginnt und offensichtlich ins Ultrarot hineinreicht. Das Ende des Spektrums erscheint wie abgeschnitten. Die Farbsalze sollten also dem menschlichen Auge grün erscheinen. Außerdem ist aber bei diesen Farbsalzen eine breite Bande im Grün vorhanden. Hierdurch verschiebt sich der Schwerpunkt der Absorption in das Gebiet zwischen Rot und Grün, etwa ins grünlich Gelbe, sodaß die Lösungen in der Komplementärfarbe hierzu, nämlich blau-violett erscheinen. Das Hauptmaximum aber ist in beiden Fällen ins Ultrarot gerückt und damit für unser Auge unwirksam geworden. Die im physikalischen Institut der Universität Bonn durchgeführte Ausmes-

fung des Ultrarotfpektrums zeitigte folgendes Ergebnis: Die Farbfalze mit vier Dimethylaminogruppen haben das Hauptmaximum bei $790\text{ }\mu\mu$, die Farbfalze mit vier Diäthylaminogruppen sogar bei $860\text{ }\mu\mu$ ¹⁴⁾. Auch hier bringen also diese Gruppen gegenüber der Aminogruppe einen starken bathochromen Effekt hervor, nämlich einen solchen von 60 bzw. sogar von $130\text{ }\mu\mu$. Der bathochrome Effekt ist hierbei sogar noch größer als beim Übergang von Parafuchsin zu Kristallviolett, wo er nur 47 und $53\text{ }\mu\mu$ beträgt. Überhaupt kennt man keine einfach gebaute Farbstoffklasse, die derartig langwellige Absorptionen aufweist.

Der Umsatz des Äthylens mit Silberperchlorat wird in Anisol vorgenommen und führt zu einem, aus Nitromethan-Benzolgemisch schön kristallin zu erhaltenden grünen Farbfalz. Zersetzungspunkt um 240° . Das Silber wird dabei metallisch abgeschieden. Der Körper erweist sich identisch mit dem von J. Fontaine und R. Knipp ¹⁵⁾ gefundenen Dicarbeniumperchlorat.

Mit Silbernitrat erhält man ein gleichfarbiges Farbfalz unter Abscheidung des Silbers in atomarer Form. Aus Eisessig wird der Körper kristallin erhalten. Er verpufft um 320° . Die Analyse beweist, daß das Dinitrat vorliegt.

Einen kleinen Unterschied gegenüber dem Oktaäthyl- bzw. Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen beobachten wir beim Umsatz mit Ferrichlorid. Während wir in den beiden ersten Fällen das Eisenchloriddoppelsalz isolieren konnten, findet hier keine Komplexbildung statt; wir erhalten das Dicarbeniumchlorid. Die Verbindung wird aus Äthylen und Ferrichlorid in methanolischer Lösung gewonnen; sie kann aus Methanol-Wasser-Gemisch umkristallisiert werden und bildet dann schöne violett schimmernde Nadeln. Sie ist in Wasser, Alkohol, Eisessig und Nitromethan mit tief grüner Farbe löslich, unlöslich in Äther und ähnlichen Lösungsmitteln.

Mercurichlorid und Cuprichlorid geben beim Umsatz mit dem Äthylen in Anisol, bzw. Alkohol das gleiche Dicarbeniumchlorid.

Aus den auch mit Kupfernitrat und Kupfersulfat erhaltenen


¹⁴⁾ H. Konen und Buß, Dissertation Bonn 1932 (Physikalisch. Inst.).

¹⁵⁾ Dissertation Bonn, 29 (1928). Dissertation Bonn, 44 (1931).

tief grünen Farbfalzlösungen lassen sich wieder keine kristallinen Produkte isolieren. Der Umweg über die Perchlorate ermöglicht jedoch ihre Identifizierung. In beiden Fällen werden gleiche Perchlorate erhalten, die auch dem aus Silberperchlorat direkt erhaltenen Perchlorat identisch sind. Das beweist, daß in den ursprünglichen Farbfalzlösungen das Dinitrat, bzw. das Dicarbeniumsulfat vorgelegen haben müssen.


Die ganzen Versuche zeigen, daß das Tetraaminotetraphenyläthylen ganz auf der durch das Oktaäthyl- bzw. Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen gegebenen Linie liegt. Ein sehr erheblicher Unterschied ist bei diesen drei Äthylenen nicht festzustellen.

Ganz anders ist die Sachlage schon beim Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen. Mit Silberperchlorat wird ein in Lösung tief rotes Perchlorat unter Abscheidung von zwei Atomen metallischem Silber erhalten. Es kann aus Eisessig umkristallisiert werden und bildet rote Nadeln mit metallisch-grünem Oberflächenglanz. Die Substanz ist äußerst explosiv; sie erweist sich durch die Analyse als das Dicarbeniumperchlorat. Die Konstitutionsformel ist also:




Bei der Darstellung dieser Verbindung traten vielfach, besonders wenn Äthylen im Überschuß vorhanden war, grüne Ablauffarben auf, welche Erscheinung man bisher fälschlicherweise als Dichroismus bezeichnete.¹⁶⁾ Diese grüne Ablauffarbe ist aber, wie ich feststellte, auf die Anwesenheit eines zweiten Farbfalles zurückzuführen und es ist mir gelungen, diesen grünen Farbstoff zu isolieren. Aus den beim Umsatz des Äthylens mit Silberperchlorat erhaltenen Rohprodukten läßt sich der grüne Körper mit Chlorbenzol extrahieren, und dann mit Äther ausfällen (siehe Versuchsteil). Die Verbindung erweist sich als schwach explosiv und ist nicht silberhaltig. Sie löst sich in Eisessig, Alkohol und Pyridin gut mit grüner Farbe. Äther, Benzol und Ligroin lösen nicht. Eine Analyse konnte aus

Substanzmangel nicht gemacht werden. Bei einem analogen, durch Umsatz mit Cuprichlorid isolierten Körper, zeigt die Analyse einen Gehalt von einem Chloratom auf ein Äthylen, was den Schluß zuläßt, daß auch obiges Produkt ein ClO_4^- auf ein Äthylen enthält. Darauf weist ja auch schon die geringere Explosivität hin. Eine unbedingt sichere Konstitutionsformel für diese Verbindung läßt sich einstweilen noch nicht aufstellen. Am nächsten liegt die Auffassung als Ammeniumsalz.¹⁷⁾




Von solchen Ammeniumsalzen kennt man seit langem eine ganze Reihe; es sind die sogenannten „Wurster’schen“ Farbstoffe.¹⁸⁾ Man hatte sie früher als merichinoide Chinonimoniumsalze aufgefaßt.



Nach W. Dilt he y, der ihre Konstitution zuerst richtig erkannt hatte, formuliert man heute z. B.¹⁹⁾:

Monoammeniumsalze




16) J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928.

17) R. Wizinger, Organische Farbstoffe, 21 ff. (1933).




18) R. Wizinger und A. Grüne, Dissertation Bonn 1929, Seite 12/14.
R. Wizinger, Habilitationschrift Bonn 1927.

19) W. Dilt he y, J. pr. (2) 109, 301 (1925).

R. Wizinger, Z. f. ang. Chem. 1929, 669.



Diammeniumsalze



Weiter kennt man solche Farbsalze beim Benzidin, Dehydrophenazin und deren Derivaten, Tri- und Tetrarylhydrazin ²¹⁾, Dipyridil und Triphenylamin ²²⁾. Es erscheint durchaus denkbar, daß auch das eben beschriebene grüne Perchlorat ein Vertreter einer neuen Gruppe von Ammeniumsalzen ist. Eine genauere Untersuchung darüber war wegen der geringen Substanzmenge nicht möglich; sie muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben.

Beim Umsatz des Äthylens mit Silbernitrat scheint sich erst ein Anlagerungsprodukt von einem Mol Äthylen mit zwei Molen Silbernitrat zu bilden, das sich jedoch sofort unter Ausscheidung von metallischem Silber und Bildung des Dicarbeniumnitrats zu zersetzen beginnt. Aus der blut-roten, stets neu filtrierten methanolischen Lösung schied sich nämlich noch nach mehreren Wochen immer weiteres metallisches Silber ab. Die Stickstoffanalysen der isolierten Substanz ergeben denn auch einen Wert, der zwischen dem des Anlagerungsproduktes und dem Wert des Dicarbeniumnitrats liegt. Ein reines Dicarbeniumnitrat konnte auch nach wochenlangem Stehenlassen nicht erhalten werden.

20) Piccard, H. A. 7, 77.


21) H. Wieland: Die Hydrazine, Stuttgart 1913, 62 ff.

22) E. Weitz, B. 59, 432 (1926).

Br. Emmert, B. 57, 1392 (1924).


Auch bei diesen Umsetzungen konnte ein grüner Körper in Lösung beobachtet werden.

Mit Ferrichlorid führte der Umsatz des Äthylens in Alkohol zu einem roten, aus Methanol kristallin zu erhaltenden Körper. Er ist eisenhaltig. Die Analyse führte zu dem merkwürdigen Resultat, daß ein Komplex von einem Mol Äthylen und zwei Molen Ferrichlorid $C_{30}H_{30}N_2$, $2FeCl_3$, vorliegt. Die Substanz ist in Wasser, Alkohol und Eisessig mit tief roter Farbe löslich, unlöslich in Äther, Benzol und Ligroin. Die rote Farbe und die Löslichkeitsverhältnisse deuten darauf hin, daß ein Farbfalz mit dem Kation:




vorliegt. Dann müssen aber die Ferrichlorid-Moleküle die negative Ladung aufgenommen haben, und Anionen der ungewöhnlichen Zusammensetzung $FeCl_3^-$ bilden.

Die Konstitution dieses tiefroten Komplexes ist wohl analog derjenigen der interessanten Komplexe des Tetramethyldiamido- und Triphenylamins, die W. M a d e l u n g im Jahre 1927 beschrieb.²³⁾ Dieser Forscher beobachtete, daß die genannten Amine mit Halogeniden der höheren Wertigkeitsstufen einer ganzen Reihe von Metallen wie mit freiem Halogen tiefblaue Additionsprodukte liefern. Es muß also wie dort das gleiche tiefblaue Kation — in diesem Falle ein Ammeniumion — vorhanden sein, und das Metallhalogenid Anion geworden sein. Einige dieser Substanzen seien hier angeführt:



23) W. Madelung, Über die blauen Anlagerungsverbindungen substituerter Triphenylamine. A. 454, 7/37 (1927).




Man kann die Annahme machen, daß in den Komplexen mit Eifenchlorid, Kupferchlorid und Zinntetrachlorid die Anionen $[\text{FeCl}_3]^-$ d. h. $\text{FeCl}_2 \cdot \text{Cl}^-$, $[\text{CuCl}_2]^-$ d. h. $\text{CuCl} \cdot \text{Cl}^-$ und $[\text{SnCl}_4]^-$ d. h. $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{Cl}^-$ vorliegen; in anderen Fällen aber, z. B. bei $[\text{SbCl}_5]^-$ und $[\text{TiCl}_3]^-$ verfagt eine analoge Deutungsmöglichkeit. Vielleicht ist das Metallhalogenid nebenvalenzmäßig noch an ein Benzolkohlenstoffatom gebunden. Darauf scheint vor allem die Verbindung mit Ferricyanwasserstoff (nur fünf Cyangruppen!) hinzuweisen. Eine Bindung an das Stickstoffatom einer Dimethylamino-Gruppe kommt nicht in Frage, da sonst deren auxochrome Wirkung ausgeschaltet wäre.

Auf jeden Fall ergibt sich aus der Arbeit Madelungs und unseren Beobachtungen, daß derartige unnormale Farbsalze tatsäch-

lich existieren. Weiter unten begegnen wir einem weiteren Vertreter dieser Körperklasse. Eine zusammenfassende Untersuchung über diesen Gegenstand dürfte sehr reizvoll sein.


Mit Cuprichlorid wird in einer alkoholischen Lösung des Äthylens ein aus Eisessig kristallin zu erhaltender Körper gewonnen. Er ist in Wasser, Alkohol und Eisessig gut mit blut-roter Farbe löslich. Die Analyse zeigt, daß das Dicarbeniumchlorid vorliegt. In reinem Zustand ist die Verbindung nur bei Anwendung eines großen Überschusses von Cuprichlorid zu erhalten. Wird zu wenig Cuprichlorid angewandt, so bildet sich nebenher immer ein grüner Körper. Auch diesen zu isolieren ist mir gelungen. Das rote Farbsalz ist in Acetonitril unlöslich, das grüne löst sich etwas darin. Nimmt man nun Acetonitril als Lösungsmittel für den Umsatz des Äthylens mit Cuprichlorid, so scheidet sich der rote Körper (vermischt mit etwas grünem) als schmieriger Bodensatz ab, während der grüne Körper in Lösung bleibt und mit Äther ausgefällt werden kann (Näheres siehe Versuchsteil). Seine Analyse ergibt, wie oben schon gesagt: Ein Chlor auf ein Äthylen. Bei dem jetzigen Stand der Erkenntnis muß die Verbindung als Ammeniumsalz aufgefaßt werden im Sinne der Formel:



Auf Kupfernitrat, Kupfersulfat und Mercurichlorid wirkt das Äthylen nicht mehr ein. Hier zeigt sich also schon ein deutlicher Rückgang des elektropositiven Charakters gegenüber den Äthylenen mit vier Amino- bzw. Dialkylaminogruppen.

Noch wesentlich schwächer positiviert ist das Tetramethoxytetraphenyläthylen. Die vier Methoxylgruppen befähigen das Äthylen zwar noch zur ionoiden Addition stark negativer Reste wie Cl^- , ClO_4^- und SO_4^- , doch sind die Dicarbeniumsalze in festem Zustand nicht mehr beständig. Die Farbsalze mit schwächer elektro-negativen Ionen wie: J^- oder gar CH_3COO^- bestehen bestenfalls

fetzung ein Zweifel nicht bestehen. In welcher Weise das Silberperchlorat angelagert ist, etwa oxoniumsalzartig an die Methoxygruppen oder an die Äthylenkohlenstoffatome oder sonstwie, das kann einstweilen noch nicht entschieden werden. Dieser Komplex geht nun außerordentlich leicht in das tiefblaue Dicarbeniumperchlorat und metallisches Silber über. Eiseffig löst in der Kälte blaßgelb, in der Wärme aber wird die Lösung tiefblau und Silber fällt aus. Das Gleiche geschieht in heißem Chloroform und Alkohol. Die feste Substanz wird beim Erhitzen ebenfalls dunkelblau; bei hoher Temperatur findet völlige Zersetzung statt. Es sind somit folgende Teilreaktionen ermittelt:



Offensichtlich ist die Tatsache, daß O. L ü c k e r s Dicarbeniumperchlorat aus Diäthoxydinaphtostilben stets stark silberhaltig war, darauf zurückzuführen, daß es größere Mengen eines entsprechenden Komplexes aus Diäthoxydinaphtostilben und Silberperchlorat enthielt. Auf jeden Fall stellen diese Äthylen-Silberperchlorat-Komplexe eine neue interessante Körperklasse dar.


Mit Ferrichlorid in Chloroformlösung gab das Äthylen eine intensiv blaue Lösung. Es entsteht also ein Dicarbeniumsalz, doch gelang die Isolierung nicht wegen der hohen Zeretzlichkeit.

Mit Silbernitrat, Mercurichlorid, Cuprichlorid, Cuprinitrat und Cuprifulfat wurde keine Farbreaktion beobachtet.


Die dem Tetraoxytetraphenyläthylen entsprechenden Dicarbeniumsalze sind schwarzblau.²⁸⁾ Sie sind jedoch nur bei sehr großem Säureüberschuß beständig, sonst tritt sofort Zerfall in das gelbrote Anhydro-Tetraoxytetraphenyläthylenglykol ein:

27) $\text{C}_{30}\text{H}_{28}\text{O}_4$ = Tetramethoxytetraphenyläthylen.

28) R. Wizinger und J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928.



Vom Benzaurin und Aurin her ist ein analoger Vorgang schon lange bekannt:



Daher ließ sich voraussehen, daß aus Tetraoxyteträphenyläthylen und den üblichen Metallsalzen nicht die Dicarbeniumsalze selbst, sondern deren Säureabspaltungsprodukt, das Anhydrotetraoxyteträphenyläthylenglykol zu fassen sein würde.


Die Hydroxylgruppe wirkt stärker positivierend als die Methoxylgruppe. Ganz entsprechend reagiert das Tetraoxyteträphenyläthylen noch in einigen Fällen, wo das Tetramethoxyteträphenyläthylen unwirksam ist. Beim Umsatz mit Silberperchlorat und auch mit Silbernitrat wurde Silberabfcheidung und Bildung des gelb-roten Anhydroglykols festgestellt. An der primären Bildung von Dicarbeniumsalzen kann also nicht gezweifelt werden. Mit Cuprichlorid, Cuprinitrat und Cuprifulfat wurde das Tetraoxyteträphenyläthylen ebenfalls in das Anhydroglykol übergeführt. Mercurichlorid dagegen reagiert nicht mehr mit dem Äthylen.

Recht interessante Ergebnisse brachte die Untersuchung beim Dixanthylen.


A. Werner hatte schon im Jahre 1901²⁹⁾ aus Dixanthylen mit Natriumnitrit und Eisessig Dixanthyliumdinitrat erhalten, aller-

29) B. 34, 3307 (1901).

dings in unreinem Zustand. Der damaligen Anschauung entsprechend formulierte er die Verbindung als Oxoniumfalz:



Hantzsch und Denstorf³⁰⁾ erhielten aus Dixanthylen und Jod bzw. Brom ein schwarzes und ein rotes Perbromid. Sie nahmen jedoch an, daß hier Molekülverbindungen vorlägen, in denen die Halogenmoleküle nebenvalenzartig an die Sauerstoffatome gebunden seien. Eine neuere Untersuchung von R. Wizinger und W. Brunner³¹⁾ zeigte, daß in Übereinstimmung mit den neueren Anschauungen über Konstitution und Farbe diese Verbindungen als Dicarbeniumsalze aufzufassen sind:



Die Farbe ist also nicht auf die Oxoniumsalzstruktur oder auf Nebenvalenzbindungen, sondern auf das Vorhandensein koordinativ ungefüttigter ionoider Kohlenstoffatome zurückzuführen. W. Brunner stellte mehrere Farbsalze dieser Reihe in reinem Zustand her, z. B. das Dinitrat, Diperchlorat, das Borfluorid- und Eisenchlorid-doppelsalz.


Wie ich feststellte, setzt sich das Dixanthylen in Eisessig mit Silbernitrat zum Dixanthyliumdinitrat um, und zwei Atome Silber werden frei. Zu diesem Zweck wird eine Aufschlammung von Dixanthylen in Eisessig mit Silbernitrat geschüttelt und das Rohprodukt anschließend mit verdünnter Salpetersäure gewaschen. Der Umsatz muß in der Kälte vor sich gehen, da schon bei 60° Zer-

30) Ann. 349, 1 ff. (1906).

31) R. Wizinger und W. Brunner, Dissertation Bonn 1930.


fetzung unter Entwicklung nitroser Gase erfolgt. Aus dem Reaktionsgemisch ist dann nur Xanthon zu isolieren. Die Verbindung ist identisch mit dem von W. Brunner beschriebenem Dinitrat.

Mit Ferrichlorid gibt Dixanthylen ein leuchtend rote Kristalle bildendes Farbfalz. Dieses erweist sich als identisch mit dem von W. Brunner durch doppelten Umsatz aus dem Dinitrat gewonnenen Eisenchloriddoppelfalz:



Zunächst wird also vom Dixanthylen das Ferriion zum Ferroion entladen; es bildet sich das Dixanthyliumdichlorid. Dieses geht mit überschüssigem Ferrichlorid in das Doppelfalz über.


Bei diesen beiden Umsetzungen erweist sich das Dixanthylen als ein mäßig stark positiviertes Äthylen. Der Bildungsmechanismus der beiden Farbfalze entspricht völlig dem schon an den anderen Äthylenen beobachteten. Außer diesen beiden Farbfalzen konnte ich jedoch Verbindungen isolieren, deren hypothesenfreie Deutung zur Zeit noch nicht möglich ist. Es handelt sich dabei stets um farbige Additionsverbindungen von Metallsalzen an Dixanthylen, und zwar stets im Verhältnis: 1 Mol Äthylen : 2 Mole Metallfalz. Schon W. Brunner hatte ein derartiges merkwürdiges Produkt erhalten. Beim Umsatz von Dixanthyliumdinitrat mit Mercurichlorid in Eisessig-Chlorwasserstoffsäure faßte er ein tiefrotes Farbfalz der Zusammensetzung 1 Dixanthylen: 2 Mercurichlorid. Da die Farbe die gleiche war wie bei einem Dixanthyliumfalz, mußte angenommen werden, daß auch hier das Dixanthyliumkation vorlag und es wurde mit Vorbehalt folgende Konstitution angenommen:



Durch die Annahme, daß das Mercurichlorid zum Mercurochlorid reduziert worden sei und mit dem Chlorion ein komplexes Anion bilde, kann man diese Verbindung rein formal deuten. Doch muß nachdrücklichst hervorgehoben werden, daß aus Verlegenheit zu einer Hypothese ad hoc Zuflucht genommen worden ist.

Die Verbindung entsteht, wie ich feststellte, auch beim Zusammenschmelzen von Dixanthylen mit Mercurichlorid. Doch tritt unter diesen Bedingungen auch teilweise Zersetzung ein, sodaß kein reines Produkt erhalten werden konnte. In Lösung reagiert das Dixanthylen nicht mit Mercurichlorid; die Positivierung ist also noch nicht hinreichend.

Wird zu einer Lösung von Dixanthylen in Anisol eine Lösung von Cuprichlorid in Aceton gegeben, so fällt sofort ein gelborange farbener Niederschlag der Zusammensetzung 1 Dixanthylen : 2 Cuprichlorid. Auch hier kann — mit dem gleichen Vorbehalt — eine analoge Konstitutionsformel aufgestellt werden wie für das Brunner'sche Produkt:



Die Verbindung ist in allen üblichen Lösungsmitteln unlöslich. Mit Kupfernitrat und Kupfersulfat reagiert Dixanthylen nicht mehr.

Konnte man unter Zuhilfenahme einer Zusatzhypothese die Konstitution der beiden soeben besprochenen Farbsalze noch eben deuten, so versagen einstweilen alle Deutungsversuche bei den beiden Komplexen, die ich aus Dixanthylen mit Silbernitrat und Silberperchlorat erhielt.


Während der Umsatz mit Silbernitrat in Eisessig zu Dixanthylumdinitrat führt, entsteht in Essigsäureanhydrid eine Additionsverbindung von 1 Dixanthylen mit 2 Silbernitrat. Diese Verbindung — leuchtend rote Kristalle — ist auf den ersten Blick vom Dinitrat nicht zu unterscheiden.

Silberperchlorat lagert sich in Eisessig an Dixanthylen an. Das Addukt hat die Zusammenfassung 1 Dixanthylen : 2 Silberperchlorat. Es ist unlöslich und zeigt die typische Farbe der Dixanthylumfäulze.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die soeben besprochenen Additionsverbindungen von Dixanthylen mit Schwermetallfäulzen die gleiche Problemstellung bringen wie die interessanten Verbindungen von Tetramethyldiamino-di- bzw. -triphenylamin, die M a d e l u n g entdeckte. (Vgl. auch oben beim Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen.)

Wie zu erwarten, begegnet man beim Thiodixanthylen ganz ähnlichen Verhältnissen wie beim Dixanthylen. Das Thiodixanthylen ist etwas schwächer positiviert und daher etwas weniger reaktionsfähig; die Farbfäulze sind unbeständiger.


Eine Lösung des Thiodixanthylens in Anisol wird bei Zusatz von Silberperchloratlösung sofort braun. Unter Silberabscheidung schlägt die Farbe aber bald nach tiefrot um: Di-thioxanthylumperchlorat hat sich gebildet. Durch Zugabe von Äther kann das Farbfäulz schön kristallin erhalten werden:



Mit Silbernitrat konnte der Umsatz nicht beobachtet werden, desgleichen nicht mit Kupfernitrat und Kupfersulfat.

Mit Cuprichlorid wurde dagegen wieder wie beim Dixanthylen eine Additionsverbindung erhalten. Aus einer Lösung des Äthylens in Chlorbenzol fällt auf Zugabe einer Lösung von Cuprichlorid in Aceton sofort ein violett-brauner Niederschlag aus. Er hat die Zusammensetzung 1 Thiodixanthylen : 2 Cuprichlorid. Die Verbindung ist unbeständiger als diejenige aus Dixanthylen. An der Luft ist sie nur wenige Tage haltbar; von vielen Lösungsmitteln wird sie sofort zersetzt.

Mit Ferrichlorid bildet sich das Eisenchloriddoppelsalz:



Es verhält sich ähnlich wie das entsprechende Dixanthylumfals.

Mercurichlorid konnte wieder nur durch Zusammenschmelzen mit Thiodixanthylen in Reaktion gebracht werden. Eine Isolierung war auch hier aus dem gleichen Grund wie beim Dixanthylen nicht möglich.

Das Tetraphenyläthylen, welches wie eingangs betont, sogar Brom nicht mehr und Chlor nur locker zu addieren vermag, ist dementsprechend viel zu wenig elektropositiv, um Metalle aus ihren Salzen zu verdrängen. Eine Reaktion wurde daher bei keinem der angewandten Metallsalze beobachtet.

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung läßt sich dahin zusammenfassen:

1.) Beiderseitig positivierte Äthylene verhalten sich elektrochemisch wie schwach positive zweiwertige Metalle. Sie vermögen wie diese weniger elektropositive Metalle aus ihren Salzen abzuscheiden bzw. Kationen höherer Wertigkeitsstufen zu solchen niedriger Wertigkeitsstufen zu entladen. Bei diesen Austauschreaktionen gehen die Äthylene in Dicarbeniumionen über.

2.) Es läßt sich — in groben Zügen — folgende Spannungsreihe der Tetraphenyläthylenderivate aufstellen: (nach steigender Positivierung geordnet):


Tetraphenyläthylen,
Tetramethoxytetraphenyläthylen,
Tetraoxytetraphenyläthylen,
Thiodixanthylen,
Dixanthylen,
Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen,
Tetraaminotetraphenyläthylen,
Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen,
Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen.

3.) Es wurden eine Reihe von Additionsverbindungen positiver Äthylene mit Schwermetallsalzen gefaßt, welche den Charakter von Farbsalzen besitzen. Sie haben die Zusammensetzung 1 Mol Äthylen : 2 Mol Metallsalz. Ihre valenzmäßige Deutung ist zur Zeit noch nicht möglich.

4.) Beim Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen wurden Farbsalze der Zusammensetzung: $[\text{Äthylen}] \cdot X$ gefaßt. Vermutlich liegen Ammeniumsalze vor.

Experimenteller Teil.


Oktaäthyltetraaminotetraphenyläthylen.



Das Äthylen wurde nach den Angaben von R. Knipp¹⁾ aus Tetraäthyldiaminobenzophenon und Stanniol in rauchender Salzsäure hergestellt.

1.) Umsetzungen mit Silberperchlorat.

a.) Ammoniumsalz.



Die kalten Lösungen von 1 g Äthylen und 0,5 g Silberperchlorat in Eisessig werden zusammengegeben. Schon beim Eintropfen der Perchloratlösung entsteht eine weiße Trübung, die sich jedoch im überschüssigen Lösungsmittel wieder löst. Nach zwölfstündigem Stehenlassen haben sich aus der grünlichen Flüssigkeit farblose Kristalle abgeschieden, die abfiltriert und mit Eisessig und Äther gewaschen werden. Die Kristalle sind silberhaltig. Die Analysen ergeben einen Silbergehalt von 64,7%. Daneben kann Essigsäure durch Geruch beim Erhitzen, sowie durch die Kakodylprobe nachgewiesen werden. Es liegt also Silberacetat vor.

Silberbestimmungen:

- 0,0304 g Substanz verbrauchen 1,82 ccm n/10 NaCl-Lösung
- 0,0359 g Substanz verbrauchen 2,15 ccm n/10 NaCl-Lösung
- 0,0206 g Substanz verbrauchen 1,23 ccm n/10 NaCl-Lösung


1) R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, 19.

AgOCOCH ₃	berechnet:	64,7% Ag
	gefunden:	64,6% Ag
		64,7% Ag
		64,5% Ag.

Aus der rückständigen grünen Lösung, die beim Erhitzen blau-violett wird, fällt beim Veretzen mit Äther ein gelb-grüner, zunächst schmieriger Niederschlag. Nur bei sofortigem gründlichen Auswaschen mit Äther wird es als gelb-grünes Pulver erhalten. Dieses wird beim Erhitzen zunächst tief blau und verpufft nach dem Schmelzen. Die Substanz ist silberfrei. Unter Einwirkung des Lichtes färbt sich der Körper blau bis blau-schwarz und löst sich dann auch in kaltem Eisessig sofort mit blau-violetter Farbe, während er ursprünglich als hellgrüner Körper sich in kaltem Eisessig auch hellgrün löst und erst in der Hitze in den blau-violetten Körper übergeht. In Alkohol löst sich die Verbindung hellgrün, wird jedoch, auch in der Kälte, nach kurzer Zeit blau bis blau-violett. Wasser löst in der Kälte nicht, in der Hitze nur wenig mit blauer Farbe.

Die Substanz wird in Alkohol gelöst und mit alkoholischem Kali bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Beim Verdünnen mit Wasser fällt reines Äthylen aus, das nach einmaligem Umkristallisieren aus Alkohol-Benzol bei 203 bis 205° schmilzt. Aus der eingengten rückständigen Lösung kristallisieren mit der Zeit Kristalle, die sich als Kaliumperchlorat erweisen (Flammenfärbung; Sauerstoffabgabe beim Schmelzen).

b.) Carbeniumsalz.



1 g feinpulverisiertes Äthylen wird in einer zur Lösung nicht völlig hinreichenden Menge Alkohol (ca. 30 ccm) erhitzt und mit 0,7 g Silberperchlorat in ca. 3 ccm Wasser versetzt. Sofort tritt eine tief blau-violette Farbe auf. Man erhitzt solange, bis alles Äthylen in Lösung gegangen ist. Hierbei scheidet sich das Silber z. T. als

Spiegel, z. T. als schlammiger Bodensatz quantitativ ab. Die Lösung wird abfiltriert und zur Verdunstung des Alkohols bei gewöhnlicher Temperatur hingestellt. Es scheiden sich grün-goldene Kristalle ab, die zur Reinigung mit wenig Alkohol und darauf mit viel Äther gewaschen werden.

Zerfetzungspunkt: um 220° .

Die Substanz ist leicht löslich in Alkohol, Eisessig und Aceton, spurenweise in Wasser und Benzol, unlöslich in Äther, Petroläther und Ligroin. Die Lösungen zeigen eine tief blau-violette Farbe. Im übrigen hat der Körper die nämlichen Eigenschaften wie das bei R. Knipp²⁾ beschriebene Perchlorat.


Auch beim Umsatz in thiophenfreiem Benzol und in Toluol bildet sich das intensiv blau-violette Perchlorat unter Abcheidung von zwei Atomen Silber. Das Perchlorat ist aber beim Arbeiten mit diesen Lösungsmitteln zunächst nicht kristallin.

2.) Umsatz mit Silbernitrat.

1 g feinpulverisiertes Äthylen wird in etwa 50 ccm Alkohol gelöst und mit 0,6 g Silbernitrat in 3 ccm Wasser versetzt. Beim Erhitzen färbt sich die Lösung sofort tief blau-violett. Aus der Farbstofflösung ist der Körper noch nicht kristallin erhalten worden. Zu seiner Identifizierung wird er mittels einer wässrigen Natriumperchloratlösung als das entsprechende Perchlorat gefällt. Man erhält ein violett-grün schimmerndes mikro-kristallines Pulver, das mit dem schon beschriebenen Perchlorat des Äthylens mit Silberperchlorat identisch ist.

Zersetzungspunkt: um 225° .

3.) Umsatz mit Eisenchlorid.



0,5 g sublimiertes Ferrichlorid wird in 10 ccm Methanol gelöst und zu einer Aufschlammung von 1 g Äthylen in 50 ccm Methanol

2) R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, 24.

gegeben. Es bildet sich sofort eine schwache blau-violette Farbe aus, die sich beim Erhitzen schnell vertieft. Man bringt das Gemisch etwa eine halbe Stunde auf Siedetemperatur und engt dann die Farblösung auf dem Wasserbad bis zu 20 ccm Flüssigkeit ein. Aus dieser Farbstofflösung kristallisieren gold-rote Kristalle, die sich als eisenhaltig erweisen.


Die Verbindung ist leicht löslich in Alkohol, Eisessig und Nitromethan, mäßig in Wasser mit blau-violetter Farbe. In Äther, Benzol und Petroläther ist sie unlöslich.

Analyse:

0,0734 g Substanz	0,0826 g AgCl
$C_{42}H_{56}N_4(FeCl_4)_2$	berechnet: 28,06% Cl
	gefunden: 27,84% Cl.

4.) Umsatz mit Kupferchlorid.

a) Ammoniumsalz.



1 g Äthylen wird in 50 ccm kaltem Eisessig gelöst und mit 0,6 g kristallisiertem Cuprichlorid in 2 bis 3 ccm Wasser versetzt. Man schüttelt gut durch und läßt die hellgrüne Lösung 24 Stunden stehen. In dieser Zeit haben sich kleine grüne Kristalle abgesetzt, welche sich als Kupferacetat erweisen. Berechnet auf das Äthylen ist das Kupferacetat fast quantitativ auskristallisiert. Die rückständige Lösung wird mit Äther bis zur auftretenden Trübung versetzt und gut verschlossen etwa drei Wochen stehen gelassen. Es bildet sich ein Bodensatz von blaß-grünen Schmierem, während sich die überstehende Flüssigkeit, wohl durch die Einwirkung des Lichtes, rotstichig blau färbt. Die erhaltenen Schmierem werden durch Verreiben mit Äther fest und können so als grünes Pulver bekommen werden.


umfchlägt. Beim Erhitzen wird die Farbe tief blau-violett, geht jedoch beim Erkalten wieder in den grünen Ton über.

Analyse:

0,1097 g Substanz 0,0467 g AgCl
 $C_{42}H_{56}N_4Cl_2$ berechnet: 10,34% Cl
 gefunden: 10,53% Cl.

5.) *Umsatz mit Kupfersulfat.*

a.) Ammoniumsalz.




1 g Äthylen wird in 50 ccm kaltem Eisessig gelöst und mit 0,8 g kristallisiertem Kupfersulfat in 2 bis 3 ccm Wasser versetzt. Nach gutem Durchschütteln läßt man 24 Stunden stehen. Es haben sich dann aus der hellgrünen Lösung kleine grüne Kristalle abgesetzt, welche sich als Kupferacetat erweisen. Zu der rückständigen Lösung wird bis zur auftretenden Trübung Äther gegeben und das Ganze gut verschlossen 2 bis 3 Wochen stehengelassen. Der sich abcheidende blaß blau-grüne schmierige Bodensatz wird durch Verreiben mit viel Äther fest.

Die Verbindung ist in kaltem Wasser wenig mit blaß blau-grüner Farbe löslich; in der Hitze tritt Zersetzung ein. Alkohol, Eisessig, Chlorbenzol und Anisol lösen in der Kälte mit blaß-grüner, in der Hitze mit tief blau-violetter Farbe. Pyridin löst in der Kälte wie in der Hitze wenig mit blaß-grüner Farbe.

Eine alkoholische Lösung der Verbindung wird bis zur alkalischen Reaktion mit alkoholischer Kalilauge versetzt. Der beim Verdünnen mit Wasser ausfallende Körper erweist sich nach einmaligem Umkristallisieren aus Benzol-Alkohol als reines Äthylen.

Schmelzpunkt: 205 bis 207°.

b.) Carbeniumsalz.




1 g Äthylen wird in 50 ccm Essigfäure gelöst und nach Zugabe von 0,25 g festen, wasserfreien Kupferfulfats 12 Stunden unter Rückfluß gekocht. Die Flüssigkeit hat sich tief blau-violett gefärbt. Es wird abfiltriert und der Rückstand, in welchem sich glänzende Flitterchen befinden, zuerst gut mit Eisessig und darauf gut mit Wasser ausgekocht. Der nun verbleibende Rückstand erweist sich als metallisches Kupfer. Er löst sich spielend in konzentrierter Salpetersäure und zeigt, mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion versetzt, die typische blaue Farbe des Kupferammoniakkomplexes. Der Farbstoff selbst liegt noch nicht in kristallisiertem Zustand vor. Er wird über fein Perchlorat identifiziert. Die essigsaure Lösung wird fast bis zur Trockene eingedampft und mit Wasser aufgenommen. Dazu wird ein Überschuß an wässriger Natriumperchloratlösung gegeben. In ein bis zwei Tagen fällt das Perchlorat als violettes, mikrokristallines Pulver aus. Es ist in seinen Eigenschaften dem oben beschriebenen Perchlorat aus Äthylen und Silberperchlorat identisch.

Zersetzungspunkt: um 230°.

6.) Umsatz mit Kupfernitrat.

a.) Ammoniumsalz.



1 g Äthylen wird in 50 ccm kaltem Eisessig gelöst und mit 0,6 g kristallisiertem Kupfernitrat in 2 bis 3 ccm Wasser versetzt. Es tritt keine sichtbare Reaktion ein. Nach 24stündigem Stehenlassen haben sich aus der blaß-grünen Lösung kleine grüne Kristalle ab-

gesetzt, die sich als Kupferacetat erweisen. Bis zur auftretenden Trübung wird die Lösung nun mit Äther versetzt und gut verschlossen etwa zwei bis drei Wochen stehen gelassen. Der sich abscheidende, zunächst schmierige Bodensatz, wird durch Verreiben mit Äther als grünes Pulver erhalten.

Die Verbindung ist in kaltem Wasser wenig mit blaß-grüner Farbe löslich; in der Hitze wird sie zersetzt. Alkohol, Eisessig, Chlorbenzol und Anisol lösen in der Kälte mit blaß-grüner, in der Hitze mit tief violetter Farbe. In Pyridin löst sich die Substanz in der Kälte wie in der Hitze mit blaß-grüner Farbe.

Aus einer alkoholischen, bis zur alkalischen Reaktion mit alkoholischem Alkali versetzten Lösung des Körpers fällt beim Verdünnen mit Wasser eine weiß-grünliche Substanz aus. Sie erweist sich nach einmaligem Umkristallisieren aus Alkohol/Benzol als reines Äthylen vom Schmelzpunkt 204° .

b.) Carbeniumsalz.



1 g Äthylen wird in 50 ccm Eisessig gelöst und nach Zugabe von 0,25 g wasserfreien Kupfernitrats (fein pulverisiert) 12 Stunden unter Rückfluß gekocht. Die Flüssigkeit hat sich tief blau-violett gefärbt. Es wird abfiltriert und der Rückstand wie beim Umsatz mit Kupferulfat behandelt. Auch hier erweisen sich die glänzenden Flitterchen als metallisches Kupfer. Aus der Farbstofflösung kristallisieren nach langem Stehen (zwei bis drei Wochen, wobei von Zeit zu Zeit geringe Mengen Äther hinzugefügt werden) schöne Kristalle mit grün-goldenem Oberflächenglanz. Die Verbindung erweist sich jedoch nicht als nitrathaltig; die Proben mit Nitron nach M. B u f c h³⁾ und die Reduktion mit Zink in schwefelsaurer Lösung zu Nitrit, dessen Vorhandensein durch Abscheiden von Jod aus Kaliumjodid leicht nachgewiesen werden kann, verlaufen negativ. Ein

3) M. B u f c h, B. 38, 861 (1906).

Spektroskopischer Vergleich einer essigsauren Lösung der Substanz mit einer solchen des Perchlorats zeigt absolute Übereinstimmung der Aborption, sodaß beide Körper dasselbe Kation enthalten müssen. Die Analyse zeigt denn auch, daß sich an Stelle der Nitrat-Ionen Acetat-Ionen in der Verbindung befinden. Daß sich intermediär das Nitrat gebildet hat, ist durch die Reduktion des Kupfernitrats bewiesen.

Die Verbindung löst sich leicht in Alkohol, Eisessig und Nitromethan mit blau-violetter Farbe; mäßig in Wasser; nicht in Äther und Petroläther.

Analyse:


25,70 mg Substanz, 1,73 ccm N_2 , 757 m/m, 21° .

29,20 mg Substanz, 1,90 ccm N_2 , 754 m/m, 22° .

$C_{42}H_{56}N_4(OCOCH_3)_2$ berechnet: 7,65% N_2 ,
gefunden: 7,76% N_2 , 7,44% N_2 .

7.) Umsatz mit Mercurichlorid.

a.) Ammoniumsalz.



Die kalten Lösungen von 1 g Äthylen in Eisessig und 0,9 g Mercurichlorid in wenig Wasser werden zusammengegeben und gut durchgeschüttelt. Es tritt keine sichtbare Reaktion ein. Auch nach 24stündigem Stehen ist eine Reaktion nicht festzustellen, auch ist kein Bodenkörper ausgefallen. Die hellgrüne Lösung wird nun bis zur auftretenden Trübung mit Äther versetzt und gut verschlossen zwei bis drei Wochen stehen gelassen. In dieser Zeit hat sich ein schwach blau gefärbter Körper abgesetzt, während die überstehende Lösung blau-violett geworden ist. Die Verbindung wird abfiltriert und mit Äther gewaschen.

Schmelzpunkt 214 bis 215° .


Die Substanz löst sich in Eisessig, Anisol, Benzol und Toluol in

der Kälte wie in der Hitze mit blau-violetter Farbe. Pyridin löst mit schwach gelber Farbe. In der Hitze schlägt dieser Farbton nach blau-violett um, geht jedoch in der Kälte wieder nach schwach gelb zurück.

Eine alkoholische Lösung des Körpers wird bis zur alkalischen Reaktion mit alkoholischem Alkali versetzt. Beim Verdünnen mit Wasser fällt reines Äthylen aus. Nach einmaligem Umkristallisieren zeigt es den Schmelzpunkt von 204° .

In dem Körper kann durch Abrauchen mit Salpetersäure, Aufnehmen mit verdünnter Salzsäure und Einleiten von Schwefelwasserstoffgas in die heiße Lösung Quecksilber nachgewiesen werden. Ebenfalls durch den Geruch beim Erhitzen und die Kakodylprobe Essigsäure. Es ist also anzunehmen, daß in dem Stoff Mercuriacetat neben dem oben formulierten salzsauren Salz des Äthylens vorliegt.

b.) Carbeniumsalz.



1 g Äthylen wird in 50 ccm Anisol gelöst und in der Hitze mit einer Lösung von 0,9 g Mercurichlorid in Methanol versetzt. Sofort bei der Zugabe der Mercurichloridlösung tritt eine tief blau-violette Farbe auf. Man erhitzt noch etwa zwei Stunden, filtriert vom grauen Rückstand, der sich als Mercurochlorid erweist, ab und versetzt nach dem Erkalten mit der gleichen Menge Äther. Die erhaltenen violetten Schmierer werden in Eisessig gelöst, aus welcher Lösung man nach dem Einengen winzige violette Nadelchen mit grün-goldenem Oberflächenglanz isolieren kann. Der Körper wird umkristallisiert, indem er in Methanol gelöst, das gleiche Volumen Wasser dazugegeben und das Methanol auf dem Wasserbad abgedampft wird. Es kristallisieren grün-goldene Nadeln, die kein Quecksilber enthalten.

Schmelzpunkt: 177° .

Die Substanz verhält sich genau so, wie das weiter oben be-

beschriebene, aus kristallisiertem Kupferchlorid und Äthylen gewonnene Dicarbeniumchlorid.

Analyse:

0,0248 g Substanz 0,0108 g AgCl
 $C_{42}H_{56}N_4Cl_2$ berechnet: 10,34% Cl
 gefunden: 10,56% Cl.


Belichtungsversuche mit ultra-violettem Licht.

Die in der Kälte angefetzten Versuche zur Umsetzung des Äthylens mit Silberperchlorat, Quecksilberchlorid, Cuprichlorid, Cuprinitrat und Cuprifulfat zeigten in ihren Lösungen nach längerem Stehen (zwei bis drei Wochen) eine deutliche violette Färbung. Ich nahm an, daß es sich hier um eine Einwirkung des Lichtes handelte, zumal die isolierten Körper bei Licht ebenfalls allmählich dunkler wurden. Um diese Erscheinung genauer zu untersuchen, setzte ich frisch angefetzte Proben der verschiedenen Metallsalze mit dem Äthylen in kaltem Eisessig ultra-violettem Licht aus. Schon nach zweistündiger Belichtung hatten sich die Lösungen deutlich violett gefärbt, während Vergleichsproben, die keinerlei Belichtung ausgesetzt wurden, keine sichtbare Veränderung zeigten.

Oktamethyltetraaminotetraphenyläthylen.

Das Äthylen wurde mir freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. R. W i z i n g e r zur Verfügung gestellt.

1.) Umsetzung mit Silberperchlorat.



1 g Äthylen wird in 50 ccm kaltem Anisol gelöst und mit einer Lösung von 1 g Silberperchlorat in 50 ccm kaltem Anisol versetzt. Es fällt sofort ein schwarzer Niederschlag, während die überstehende Lösung blau ist. Der Niederschlag wird abfiltriert und zur Reinigung mit viel Äther und etwas Tetrachlorkohlenstoff gewaschen. Die Substanz wird aus heißem Eisessig umkristallisiert und in Form

von Nadeln mit stark grünem Oberflächenglanz erhalten. Sie ist silberfrei.

In kaltem Wasser löst sich die Verbindung wenig, in heißem Wasser etwas mit blau-violetter Farbe. Alkohol, Eisessig, Aceton und Nitromethan lösen in der Kälte wie in der Hitze gut. In Äther und Ligroin ist der Körper unlöslich. Mit konzentrierter Schwefelsäure zeigt er eine rot-braune Farbe.


Zersetzungspunkt: um 325° .

Analyse:

0,0377 g Substanz	0,0160 g AgCl
$C_{34}H_{40}N_4(ClO_4)_2$ berechnet:	10,10% Cl
gefunden:	10,06% Cl.

Aus der rückständigen blauen Lösung wird mit Tetrachlorkohlenstoff ein tief blauer Farbstoff gefällt, der schwächer explosiv ist als der oben beschriebene violette Körper. Die Substanz ist in kaltem Eisessig mit tief blauer Farbe löslich. Sie ist silberfrei. Von einer näheren Untersuchung wurde aus Substanzmangel abgesehen.

2.) Umsetzung mit Silbernitrat.



1 g fein pulverisiertes Äthylen wird in etwa 50 ccm Alkohol mit 0,7 g pulverisiertem Silbernitrat zwei Stunden zum Sieden erhitzt. Schon bald färbt sich die Lösung tief blau und das Silber beginnt sich teils als Silber Spiegel, teils als schlammiger Bodensatz abzuscheiden. Man filtriert die heiße Lösung und läßt den Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur verdunsten. Es scheiden sich grüngoldene Nadeln ab, die man zur Reinigung erst mit wenig kaltem Alkohol und dann mit viel Äther wäscht. Die Verbindung löst sich in Alkohol und Aceton mit blau-violetter Farbe, in Eisessig mit rot-violetter Farbe. Wasser löst mäßig mit blau-violetter Farbe. Pyridin löst in der Kälte rot-violett; in der Hitze geht die Farbe über blau-violett nach grün.

Analyse:


23,02 mg Substanz, 2,58 ccm N₂, 752 m/m, 22°.

C₃₄H₄₀N₄(NO₃)₂ berechnet: 12,65% N₂

gefunden: 12,80% N₂.

Schmelzpunkt: 181 bis 183°.

3.) *Umwetzung mit Eisenchlorid.*



1 g Äthylen wird in 75 ccm Methanol gelöst und dazu 1 g subl. Ferrichlorid in 10 ccm Methanol gegeben. Sofort beim Zusammen gießen der Lösungen tritt eine tief violette Farbe auf. Man erhitzt etwa zwei Stunden zum Sieden, filtriert von etwaigen Verunreinigungen ab und läßt den Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur verdunsten. Schon bald scheiden sich reichliche Mengen grün-goldener Kristalle ab, die abfiltriert und gut mit Äther gewaschen werden. Aus dem Filtrat lassen sich durch vorsichtigen Ätherzusatz noch weitere Mengen der Substanz gewinnen. Die Verbindung löst sich mäßig in Wasser, gut in Alkohol, Aceton, Eisessig und Nitromethan mit blau-violetter Farbe. In Äther und Ligroin ist der Körper unlöslich. Konzentrierte Schwefelsäure löst unter Salzsäureabspaltung mit rot-brauner Farbe. Der Körper ist eisenhaltig; zum qualitativen Nachweis des Eisens muß die Substanz mit konzentrierter Schwefelsäure abgeraucht werden, da sich der Nachweis sonst nicht führen läßt:


Analyse:

30,42 mg Substanz, 50,04 mg CO₂, 12,12 mg H₂O, 5,59 mg Fe₂O₃
0,0770 g Substanz verbrauchen 6,74 ccm n/10 AgNO₃-Lösung.

C₃₄H₄₀N₄(FeCl₄)₂ berechnet: 45,33% C, 4,45% H₂, 31,55% Cl,
12,44% Fe;

gefunden: 44,87% C, 4,46% H₂, 31,08% Cl,
12,85% Fe.

4.) *Umsetzung mit Kupferchlorid.*



1 g Äthylen wird in 75 ccm heißem Alkohol gelöst und mit 0,5 g kristallisiertem Kupferchlorid in 10 ccm Aceton versetzt. Es tritt sofort eine tief violette Farbe auf. Man erhitzt noch eine Stunde zum Sieden, läßt erkalten und versetzt bis zur leichten Trübung mit Äther. Es kristallisieren nach kurzer Zeit kleine grüngoldene Kristalle. Die Verbindung ist in Wasser mäßig, in Alkohol, Eisessig, Aceton, Nitromethan und Anisol gut mit tief blau-violetter Farbe löslich. Unlöslich ist sie in Äther, Petroläther und Ligroin. Mineral Säuren lösen mit rot-brauner Farbe.

Analyse:

0,0410 g Substanz verbrauchen 1,42 ccm n/10 AgNO₃-Lösung,

0,0646 g Substanz verbrauchen 2,27 ccm n/10 AgNO₃-Lösung,

C₃₄H₄₀N₄Cl₂ berechnet: 12,35 % Cl

gefunden: 12,30 % Cl

12,51 % Cl.

5.) *Umsetzung mit Kupfernitrat.*

1 g Äthylen wird in 100 ccm Dioxan gelöst und mit 0,7 g wasserfreiem Kupfernitrat (fest) eine Stunde zum Sieden erhitzt. Schon sehr bald färbt sich die Lösung tief blau-violett. Aus der Farbstofflösung ist der Körper noch nicht kristallin erhalten worden. Zu feiner Identifizierung wird er mittels einer wässrigen Lösung von Natriumperchlorat als das entsprechende Perchlorat gefällt. Man erhält ein violettes, grün schillerndes mikro-kristallines Pulver, das mit dem schon beschriebenen Perchlorat des Äthylens mit Silberperchlorat identisch ist.

Zersetzungspunkt: um 300°.


6.) *Umsetzung mit Kupfersulfat.*

Auch dieser tief blau-violette Farbstoff ist nur in feiner Lösung in Dioxan beobachtet worden; eine Kristallisation gelang bisher noch

bei 200° ein Dunkelwerden der Schmelze und bei 240 bis 250° eine lebhaftes Schwefelwasserstoffentwicklung feststellen kann. Bis zur nachlassenden Schwefelwasserstoffentwicklung treibt man die Temperatur langsam auf 270°, was innerhalb vier bis fünf Stunden der Fall ist und erhitzt nun noch eine Stunde auf 280°. Man vermeide unter allen Umständen, mit der Temperatur über 290° zu gehen, da sich bei dieser Temperatur ein unerwünschter blauer Farbstoff mitbildet, der nur sehr schwierig zu entfernen ist. Sollte sich der Farbstoff trotz aller Vorsicht doch einmal mitgebildet haben, so ziehe man vor, den Ansatz fortzuschütten, da die Kosten des Ansatzes in gar keinem Verhältnis zu den aufzuwendenden Lösungsmitteln stehen. — Nach 9 bis 10 Stunden ist die Reaktion jedesmal beendet. Die beim Erkalten erstarrte Schmelze wird in einer Reibschale gut mit Äther verrieben, um schmierige Bestandteile zu lösen, abgelaugt, nochmals mit Äther gewaschen und mehrfach aus heißem Benzol, dem die gleiche Menge kochenden Alkohols zugesetzt wird, umkristallisiert. Man erhält so das Äthylen in schönen farblosen Prismen.

Schmelzpunkt: 221°.

Tetranitrotetraphenyläthylen.



Das aus Diphenylmethan und Schwefel gewonnene Tetraphenyläthylen wird in Anlehnung an die Arbeiten von R. Knipp⁵⁾ nitriert. Knipp beläßt zu dem Zweck der Nitrierung das Äthylen eine Vierteltunde bei —7° in der fünffachen Menge Salpetersäure von der Dichte 1,45 bis 1,48. Man erhält nach dieser Methode ein Gemisch von nitriertem und nicht, oder nicht ausreichend nitriertem Produkt, dessen Trennung große Schwierigkeiten bereitet. Die Ausbeuten lassen dabei natürlich zu wünschen übrig. Wesentlich bessere Erfolge werden erzielt, wenn man folgende Versuchsanordnung wählt:

5) R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, 37.

25 g Salpeterfäure von der Dichte 1,50 bis 1,51 werden durch eine gut wirkende Kältemischung auf -3° herabgekühlt. In diese kalte Säure gibt man unter gutem Rühren 5 g fein pulverisiertes Äthylen, das absolut sauber fein muß. Innerhalb 3 bis 4 Minuten steigt die Temperatur auf etwa 12° . Man läßt das Reaktionsgemisch noch eine weitere Minute stehen und gießt dann in kaltes Wasser. Das in gelben Flocken ausfallende Produkt wird abfiltriert, mit viel Wasser gewaschen und aus heißem Eisessig umkristallisiert. Das Tetranitrotetraphenyläthylen wird in Form gelber Nadeln vom Schmelzpunkt 291° erhalten.

Die Ausbeuten betragen von 25 g Tetraphenyläthylen ausgehend 21 g reines Tetranitrotetraphenyläthylen, das sind 55% der Theorie.

Tetraaminotetraphenyläthylen.⁶⁾




In eine Aufschlammung von 50 g Stannochlorid in 200 ccm Eisessig wird solange Salzfäuregas eingeleitet, bis fast alles Stannochlorid gelöst ist. Dann werden in diese Lösung 8 g fein pulverisiertes, reinstes Tetranitrotetraphenyläthylen eingetragen. Nach kurzer Zeit setzt die Reduktion unter Erwärmen ein, die durch Erhitzen auf dem Wasserbad zu Ende geführt wird. Tetraaminotetraphenyläthylen ist als gelbes Zinnchloriddoppelsalz ausgefallen. Es wird abfiltriert, in Wasser gelöst und mit konzentrierter Natronlauge zerlegt. Die Mischung wird eine Viertelstunde auf Siedetemperatur gehalten. Der sich beim Erkalten abscheidende gelbe, flockige Niederschlag wird nach mehrfachem Dekantieren abfiltriert, getrocknet und aus Pyridin umkristallisiert. Das Amin wird als braun-gelb gefärbter kristalliner Körper vom Smp. 319 bis 321° (unter Rotfärbung) erhalten. Es stimmt mit dem von R. Knipp aus seinem Tetranitrotetraphenyläthylen gewonnenen Amin in allen seinen Eigenschaften überein.

6) R. Wixinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, 37. Seite 42.

Die Ausbeuten betragen von 8 g Tetranitrotetraphenyläthylen ausgehend 6 g reines Amin, das sind 97% der Theorie.

1.) *Umsetzung mit Silberperchlorat.*




1 g Äthylen wird in 50 ccm Anisol gelöst und mit einer anisolfischen Lösung von 1 g Silberperchlorat etwa eine Stunde erhitzt. Man erhält einen schwarzen Bodenkörper, der zur Entfernung nicht umgesetzten Äthylens und Perchlorats mehrfach mit Anisol ausgekocht wird. Der Rückstand wird in heißem Nitromethan gelöst, wobei metallisches Silber zurückbleibt. Die heiße, tief grün gefärbte Lösung wird mit der doppelten Menge heißen Benzols versetzt und einige Zeit stehen gelassen. Es kristallisieren grüne Plättchen, die an der Luft ihren grünen Schimmer verlieren und schwarz-glänzend werden. Zur Erhaltung des grünen Schimmers müssen die Kristalle nach dem Waschen schnell mit Äther getrocknet werden.

Bei einem weiteren Versuch in Eisessig wurden, ebenfalls beim Umkristallisieren aus Nitromethan/Benzol feine violette Nadelchen an Stelle der grün schimmernden Plättchen erhalten. Die beiden Körper verhalten sich untereinander absolut übereinstimmend, wie auch mit den von J. Fontaine und R. Knipp bereits beschriebenen Perchloraten.⁷⁾

Zerfetzungspunkt: um 340°.

2.) *Umsetzung mit Silbernitrat.*



1 g Tetraaminotetraphenyläthylen wird in 50 ccm Eisessig gelöst, mit 0,8 g fein pulverisiertem Silbernitrat versetzt und etwa

7) R. Wizinger und J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928, 29.

R. Wizinger und R. Knipp, Dissertation Bonn 1931, 44.

eine Stunde zum Sieden erhitzt. Die Lösung wird sehr schnell tief dunkelgrün unter Abcheidung von metallischem Silber, das sich zum Teil als Silber Spiegel absetzt. Man filtriert ab und läßt ein bis zwei Tage stehen. Es haben sich in dieser Zeit kleine grün-goldig schimmernde Kristalle abgesetzt, die filtriert und mit Äther gewaschen werden.

Die Substanz verpufft ohne zu schmelzen um 320° unter Entwicklung nitroser Gase. Im Wasser ist das Nitrat spurenweise, in Alkohol, Eisessig und Nitromethan gut löslich. Unlöslich ist es in Äther, Benzol und Ligroin. Die Lösungen besitzen einen schönen dunkelgrünen Farbton.


Analyse:

17,99 mg Substanz, 2,54 ccm N_2 , 754 m/m, 24° .

$C_{26}H_{24}N_4(NO_3)_2$ berechnet: 16,28% N_2

gefunden: 16,03% N_2 .

3.) Umsetzung mit Kupferchlorid.



1 g Äthylen wird in 50 ccm Alkohol gelöst und mit 0,8 g fein pulverisiertem Kupferchlorid (krist.) eine Stunde zum Sieden erhitzt. Die alkoholische Lösung wird sehr schnell tief dunkelgrün. Man filtriert und läßt über Nacht stehen. Es kristallisieren aus der Lösung sehr schöne blau-grün schimmernde Nadeln, die umkristallisiert werden, indem man sie in Methanol löst, die gleiche Menge Wasser zusetzt und nun den Methylalkohol auf dem Wasserbad verjagt. Beim Abkühlen kristallisiert das Chlorid in langen Nadeln mit blau-violettem Schimmer.

Die Substanz ist in Wasser mäßig löslich, gut in Alkohol, Methanol, Eisessig und Nitromethan. In Chloroform, Äther, Benzol und Ligroin ist sie unlöslich, verhält sich im übrigen wie das bereits von J. Fontaine beschriebene Chlorid.⁸⁾

8) Dissertation Bonn 1928, 26.

Analyse:

0,0198 g Substanz verbrauchen 0,87 ccm n/10 Silbernitratlösung.

0,0934 g Substanz verbrauchen 4,00 ccm n/10 Silbernitratlösung.

$C_{26}H_{24}N_4Cl_2$ berechnet: 15,35% Cl

gefunden: 15,61% Cl

15,20% Cl.

4.) *Umsatz mit Ferrichlorid.*

1 g Tetraaminotetraphenyläthylen wird in 50 ccm Methanol gelöst und mit einer methanolischen Lösung von 1 g kristallisiertem Ferrichlorid versetzt. Die sofort auftretende grüne Farbe vertieft sich beim Erhitzen sehr schnell. Nach etwa einer Stunde gibt man zu der nun tief dunkelgrünen Lösung die gleiche Menge Wasser und dampft den Methylalkohol auf dem Wasserbad ab. Beim Erkalten scheiden sich aus der wässrigen Lösung schwarz-violette Nadeln ab. Der Körper wird auf die gleiche Weise nochmals umkristallisiert. Er gleicht in seinen Eigenschaften völlig dem oben beschriebenen Chlorid. Der Körper ist eisenfrei, was durch die übliche Probe mit gelbem Blutlaugensalz nachgewiesen ist.

Analyse:

0,1506 g Substanz 0,0973 g AgCl

$C_{26}H_{24}N_4Cl_2$ berechnet: 15,35% Cl.

gefunden: 15,80% Cl.

5.) *Umsetzung mit Kupfersulfat.*

Der Umsatz des Äthylens in Anisol, Eisessig oder auch schon in Wasser mit Kupfersulfat vollzieht sich stets sehr leicht beim Erhitzen. Man erhält schöne dunkelgrüne Lösungen, aus denen ein kristallisiertes Produkt jedoch nicht zu fassen ist. Die Identifizierung des Sulfates ist über das entsprechende Perchlorat möglich.

Man erhitzt zu dem Zweck 1 g Äthylen mit 1,25 g fein pulverisiertem kristallinen Kupfersulfat kurze Zeit in Eisessig. Die Reaktion vollzieht sich dann ohne weiteres Erhitzen, was an der Vertiefung der Farbe zu erkennen ist. Ein zu langes Erhitzen zerstört den gebildeten Farbstoff wieder; man muß also stets nur kurze Zeit

erwärmen und dann geraume Zeit stehen lassen. Die so erhaltene Farbstofflösung wird auf dem Wasserbad sehr weit eingengt und mit einem großen Überschuß wässriger Natriumperchloratlösung versetzt. Nach einigen Tagen hat sich ein grünschwarzes Pulver abgesetzt, in welchem kein Sulfat-Ion nachgewiesen werden kann. Der Körper ist explosiv, von grüner Lösungsfarbe und zeigt in seinem sonstigen Verhalten die Eigenschaften des beim Umsatz mit Silberperchlorat erhaltenen Perchlorats.


Verpuffungspunkt: um 355° .

6.) *Umsetzung mit Kupfernitrat.*

Auch beim Umsatz des Äthylens mit kristallisiertem Kupfernitrat ist kein kristallines Produkt gefaßt worden, obwohl eine Reaktion zum grünen Farbstoff auch schon in wässriger Lösung eintritt. Zur Identifizierung des vorliegenden Farbstoffs wird auf die gleiche Art und Weise wie oben beim Kupfersulfat beschrieben, das Perchlorat dargestellt. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein schwarzgrünes, mikro-kristallines Pulver, in welchem kein Nitrat-Ion nachgewiesen werden kann. Der Körper ist explosiv, von grüner Lösungsfarbe und zeigt die gleichen Eigenschaften, wie der beim Umsatz mit Silberperchlorat erhaltene Körper.

Verpuffungspunkt: um 340° .

7.) *Umsetzung mit Mercurichlorid.*



1 g Tetraaminotetraphenyläthylen wird in 50 ccm Anisol gelöst, mit 1,35 g fein pulverisiertem Mercurichlorid versetzt und eine Stunde zum Sieden erhitzt. Man erhält einen schwarzen Bodensatz, der mit Methanol ausgezogen wird. Die tief dunkelgrüne methanolische Lösung wird mit der gleichen Menge Wasser versetzt und das Methanol auf dem Wasserbad verjagt. Es kristallisieren winzige violette Nadeln, die in allen ihren Eigenschaften dem oben beschriebenen Dicarbeniumchlorid entsprechen.

Analyse:


0,0941 g Substanz 0,0594 g AgCl
 $C_{26}H_{24}N_4Cl_2$ berechnet: 15,35% Cl
 gefunden: 15,62% Cl.

Tetramethyldiaminotetraphenyläthylen.

Das Äthylen wird nach der Vorschrift von J. Fontaine⁹⁾ in Anlehnung an die Arbeiten von R. Willstätter und M. Goldmann¹⁰⁾ durch Reduktion von p-Dimethylaminobenzophenon mit Stanniol in konzentrierter Salzsäure dargestellt.

1.) Umsetzung mit Silberperchlorat.

a.) Carbeniumsalz.




1 g Äthylen wird in 50 ccm Eisessig gelöst und in der Siedehitze nach und nach mit einer Lösung von 7 g Silberperchlorat in 50 ccm Eisessig versetzt. Die Lösung färbt sich unter Abcheidung von metallischem Silber tief rot. Aus dieser essigsauren Lösung kristallisieren über Nacht rote Nadeln mit metallisch-grünem Oberflächenglanz, die aus Eisessig umkristallisiert werden. Die Substanz löst sich in Wasser, Alkohol und Eisessig mit roter Farbe. In Äther, Benzol und Petroläther ist sie unlöslich. Pyridin löst in der Kälte mit roter Farbe, die beim Erhitzen nach grün umschlägt.

Analyse:

0,0653 g Substanz 0,0306 g AgCl
 $C_{30}H_{30}N_2(ClO_4)_2$ berechnet: 11,55% Cl.
 gefunden: 11,59% Cl.

9) R. Wizinger und J. Fontaine, Dissertation Bonn 1928, 14.
 10) B. 39, 3768 (1906).

b.) Ammeniumfalz. (?)





Gibt man zu einer essigsauren (oder sonstigen) roten Lösung obigen Perchlorats weiteres Äthylen und erhitzt eine Zeitlang, dann erhält die Lösung einen grünen Schimmer, der sich bei Zugabe von noch mehr Äthylen vertieft, bei Zugabe von Silberperchloratlösung jedoch wieder verschwindet. Eine rein grüne Lösung kann auf diese Art und Weise nicht erhalten werden. Auch bei Zugabe von nur sehr wenig Silberperchlorat zu einer Äthylenlösung war die Durchsicht immer noch rot. Der grüne Körper konnte jedoch wie folgt isoliert werden:

1 g Äthylen wird in 50 ccm Xylol gelöst und mit einer Lösung von 1 g Silberperchlorat in 50 ccm Xylol etwa eine Stunde zum Sieden erhitzt. Es hat sich dann ein brauner Bodenkörper abgeschieden, der im Soxhlet mit Chlorbenzol ausgezogen wird. Die chlorbenzolitische Lösung ist blau-grün. Mit der doppelten Menge Äther wird ein grünes Pulver gefällt, das an der Luft leicht schmiert. Man muß, um das zu verhindern, sehr gut mit Äther waschen. Die Ausbeute an reinem grünen Produkt ist sehr schlecht.

Die Verbindung ist explosiv, jedoch wesentlich schwächer als das rote Perchlorat. Sie ist wie dieses nicht silberhaltig. In Eisessig, Alkohol und Pyridin löst sich der Körper gut mit grüner Farbe. Äther und Ligroin lösen nicht.

2.) Umsetzung mit Silbernitrat.





1 g Äthylen wird in 70 ccm Methanol gelöst und in der Hitze mit einer Lösung von 1 g Silbernitrat (geringer Überschuß) versetzt. Es entsteht sofort eine blut-rote Lösung unter gleichzeitiger Ausbildung eines schwachen Silberspiegels. Man erhitzt noch eine viertel bis eine halbe Stunde und läßt nach dem Abfiltrieren vom ausgeschiedenen Silber bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Aus dieser Farblösung hat sich am nächsten Tag wieder ein Silberspiegel abgesetzt. Es wird nochmals filtriert und wieder stehen gelassen. Auch jetzt scheidet sich nach einigen Tagen wiederum ein schwacher Silberspiegel ab. Aus dieser Lösung wird der Körper durch vorsichtigen Zusatz von Äther erhalten. Er löst sich gut in Alkohol, Eisessig und Anisol mit roter Farbe, aus welchen Lösungen sich nach geraumer Zeit noch geringe Mengen Silber abscheiden, ohne eine Farbänderung hervorzurufen. In Äther, Petroläther und Ligroin ist die Verbindung unlöslich; Pyridin löst in der Kälte rot, in der Hitze grün.

Analyse:

23,68 mg Substanz, 1,72 ccm N₂, 760 m/m, 23°.

25,93 mg Substanz, 1,90 ccm N₂, 764 m/m, 23°.

C₃₀H₃₀N₂(NO₃)₂ berechnet: 10,37% N₂,

C₃₀H₃₀N₂, 2AgNO₃ berechnet: 7,42% N₂,

gefunden: 8,39% N₂,

8,49% N₂.

Die Analysen, wie auch das Verhalten der Substanz zeigen, das Körper I neben dem Körper II vorliegt.

Auch bei dem Nitrat wurde ein grüner Körper beobachtet, er liegt jedoch noch nicht in analysenreiner Form vor.

3.) Umsetzung mit Eisenchlorid.

1 g Äthylen wird in 75 ccm Alkohol gelöst und mit 1 g sublimiertem Ferrichlorid in 30 ccm Alkohol versetzt. Es tritt sofort eine blut-rote Farbe auf, die sich bei etwa ¼stündigem Er-


hitzen noch verstärkt. Beim Abkühlen scheiden sich aus dieser Lösung rote Kristalle ab, die filtriert und zunächst mit wenig Alkohol und dann mit viel Äther gewaschen werden. Die Substanz wird aus Methanol umkristallisiert. Sie ist löslich in Wasser, Alkohol und Eisessig mit tief roter Farbe. Der Körper ist eisenhaltig.

Analyse:

0,0524 g Substanz	0,0110 g Fe_2O_3
0,0311 g Substanz	0,0362 g AgCl
$\text{C}_{34}\text{H}_{40}\text{N}_2(\text{FeCl})_2$	berechnet: 15,08% Fe; 28,67% Cl
	gefunden: 14,68% Fe; 28,79% Cl.

4.) *Umsetzung mit Kupferchlorid.*

a.) Carbeniumsalz.




1 g Äthylen wird in 50 ccm Alkohol gelöst und mit 3 g kristallisiertem Kupferchlorid in 25 ccm Alkohol versetzt. Sofort bei der Zugabe von Cupridchlorid tritt eine tief rote Farbe auf. Es wird etwa eine Viertelstunde erhitzt und die erkaltete Lösung mit der doppelten Menge Äther versetzt. Mit der Zeit setzt sich ein roter schmieriger Bodenkörper ab, der aus heißem Eisessig umkristallisiert wird. Die Verbindung löst sich in Wasser leicht mit blutroter Farbe; beim Erwärmen tritt Zersetzung ein, Alkohol und Eisessig lösen sehr gut mit blut-roter Farbe. In Äther, Benzol und Ligroin ist der Körper unlöslich. Pyridin löst in der Kälte mit roter Farbe; in der Hitze schlägt der Farbton nach grün um.

Analyse:

0,0176 g Substanz	0,0105 g AgCl
$\text{C}_{30}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{Cl}_2$	berechnet: 14,82% Cl
	gefunden: 14,76% Cl.

b.) Ammeniumfalz. (?)



Eine Lösung obigen Chlorids in Eisessig zeigt beim Erhitzen mit weiterem Äthylen einen grünen Schimmer, der auf Zusatz von Cuprichloridlösung wieder verschwindet. Eine rein grüne Lösung kann jedoch so nicht gewonnen werden, da der Farbton stets noch rot enthält. Versetzt man jedoch eine Lösung von 2 g Äthylen mit einer Lösung von 1 g kristallisiertem Kupferchlorid in Acetonitril, erhitzt die Mischung etwa eine Viertelstunde und läßt zwei bis drei Tage stehen, dann hat sich der mitentstandene rote Körper als schmieriger Bodensatz abgeschieden und die überstehende Lösung zeigt jetzt eine klare grüne Farbe. Mit etwa der doppelten Menge Äther wird der an der Luft leicht schmierende grüne Körper gefällt, der, gut mit Äther gewaschen, als grünes Pulver erhalten wird. Die Verbindung ist löslich in Alkohol, Eisessig, Äthylenbromid und Pyridin mit grüner Farbe; in Äther, Benzol und Ligroin ist sie unlöslich.

Analyse:

0,00733 g Substanz	0,00234 g AgCl
$\text{C}_{30}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{Cl}$	berechnet: 7,81% Cl
	gefunden: 7,56% Cl.

Mit Kupfernitrat, Kupferfulfat und Mercurichlorid konnte das Äthylen nicht in Reaktion gebracht werden.

Dianifylthioketon

wurde nach L. Gattermann und J. Fontaine¹¹⁾ aus Anifol, Thiophosgen und Aluminiumchlorid dargestellt.


Tetramethoxytetraphenyläthylen.

Das Äthylen wurde nach L. Gattermann und J. Fontaine aus Dianifylthioketon und Kupferpulver gewonnen.¹²⁾

11) B. 28, II, 2869 (1895); Dissertation Bonn 1928, 30.

12) B. 28, II, 2874 (1895); Dissertation Bonn 1928, 31.

1.) *Umsetzung mit Silberperchlorat.*



In Anlehnung an die Arbeiten von O. L ü c k e r ¹³⁾ versuchte ich, ein Anlagerungsprodukt von Silberperchlorat an obiges Äthylen zu erhalten. Zu dem Zweck löste ich 0,2 g Äthylen in 10 ccm Chloroform und gab dazu eine essigsaure Lösung von 0,3 g Silberperchlorat. Es trat sofort eine tief blaue Farbe auf, die jedoch bei Zugabe von absolutem Äther zersetzt wurde.

Die gleiche Farbe trat auf, wenn eine Lösung des Äthylens in Chloroform mit festem Silberperchlorat erhitzt wurde.

Auch bei Zugabe einer methylalkoholischen Lösung von Silberperchlorat zu einer Lösung des Äthylens in Chloroform trat die Farbe auf, (schon in der Kälte) doch konnte der Farbstoff in keinem Fall isoliert werden, da er bei Zugabe von Äther sofort der Zersetzung unterlag.

Gibt man jedoch unter Eiskühlung zu einer Lösung von 0,2 g Äthylen in Chloroform (10 ccm) eine ätherische Lösung von 0,3 g Silberperchlorat, dann tritt nur eine geringe blau-grüne Färbung der Lösung ein. Sehr bald scheiden sich aus dieser Mischung graue einheitliche Kristalle ab. Die Substanz wird abfiltriert und mit Äther gewaschen. Sie ist explosiv und enthält Silber. Beim Schmelzen wird der Körper blau, ebenso beim Lösen in heißen Lösungsmitteln wie: Alkohol, Eisessig und Chloroform, unter Abscheidung von metallischem Silber. Die Farbe geht in den Lösungen jedoch sehr bald zu-

13) R. Wizinger und O. Lück er, Dissertation Bonn 1929, 52.

rück. In der Kälte ist der Körper lediglich in Pyridin und Eisessig mit schwach gelber Farbe löslich.

Zersetzungspunkt: 259° unter vorherigem Schmelzen und Dunkel-färben.

Analyse:	0,0858 g Substanz	0,0179 g Ag
	0,0434 g Substanz	0,0132 g AgCl
$C_{30}H_{28}O_4(AgClO_4)_2$	berechnet:	24,90% Ag; 8,20% Cl
	gefunden:	21,54% Ag; 7,53% Cl.

Die Analysenwerte sind ungenau, da der Körper (das Anlage-rungsprodukt) stets etwas in die Dicarbeniumverbindung übergeht, was ja an der auftretenden Blaufärbung sehr leicht zu erkennen ist.


2.) Umsetzung mit Ferrichlorid.

Beim Erhitzen von entsprechenden Mengen Äthylen mit subl. Ferrichlorid in trockenem Benzol trat sofort eine tief violett-blaue Farbe auf. Dieser Farbstoff war etwas beständiger als das durch den Umsatz des Äthylens mit Silberperchlorat erhaltene, doch war die Zerfetzlichkeit immer noch so groß, daß eine Isolierung des Farb-stoffs durch Fälln mit Äther nicht gelang. Eine Lösung des Farb-stoffs in Chloroform war schon recht beständig, Kristallisationsver-fuche mißlangen jedoch.

Um in absolut wasserfreiem Lösungsmittel zu arbeiten, wurde eine Mischung von 80 Teilen Essigsäure und 20 Teilen Essigsäure-anhydrid bereitet und zwei Tage stehen gelassen. In dieser Mischung wurden dann die entsprechenden Mengen subl. Ferrichlorid und Äthylen gelöst und die kalten Lösungen zusammen gegeben. Es trat auch hier sofort die charakteristische violett-blaue Farbe auf. Ein Versuch, diesen Farbstoff als Perchlorat zu fällen gelang nicht. Es konnte jedoch bei vorsichtigem Einengen der Farbstofflösung im Vakuum eine Spur von blau-schwarzen Kristallen beobachtet werden, die bei dem Versuch, sie zu isolieren, sich zersetzten.

Mit Silbernitrat, Kupferniträt, Kupfersulfat und Mercurichlorid konnte das Äthylen nicht in Reaktion gebracht werden.

Tetraoxytetraphenyläthylen.



Die Verbindung wurde nach den Angaben von A. Behr¹⁴⁾ dargestellt. Reines Tetraphenyläthylen wird mit konzentrierter Schwefelsäure sulfuriert und das Bariumsalz der Sulfosäure der Alkalischmelze unterworfen. Nach Lösen der Schmelze in Wasser und Anfäuern mit Salzsäure, wird der entstandene Niederschlag mit Eisessig ausgezogen. Die Ausbeuten bei dieser Methode sind, wohl durch unvollständiges Sulfurieren wie durch Verluste bei der Alkalischmelze äußerst unbefriedigend. Es wurde deshalb der Versuch gemacht, das Äthylen auf einem andern, zugänglicheren Weg darzustellen.

1.) Aus Tetraaminotetraphenyläthylen.

Das Äthylen wird unter guter Kühlung innerhalb 10 Stunden nach der bekannten Methode diazotiert und das Reaktionsprodukt gut mit Wasser gekocht. Es fällt ein hell-brauner Körper aus, der jedoch kein Tetraoxytetraphenyläthylen ist. Es dürfte wohl sehr schwer fallen, alle vier Aminogruppen im Tetraaminotetraphenyläthylen zu diazotieren, sodaß das vorliegende Produkt neben Oxy- auch noch Aminogruppen enthalten dürfte.

2.) Aus Tetramethoxytetraphenyläthylen.

1 g Tetramethoxytetraphenyläthylen wird in 25 ccm Benzol gelöst und mit 7 g Aluminiumbromid in 50 ccm Benzol versetzt. Es tritt sofort eine Rotfärbung auf, die nach drei bis vierstündigem Kochen verschwindet. Nach dieser Zeit hat sich ein Teer abgesetzt. Die benzolische Lösung wird abgesehen und der Teer mit Natronlauge zerlegt. Nach einmaligem Aufkochen wird die schmutzig grüne Lösung filtriert und schwach mit Salzsäure angesäuert. Der ausfallende, blaß rot-violette Niederschlag wird abfiltriert und aus heißem Eisessig mehrfach umkristallisiert. Das Tetraoxytetraphenyl-

äthylen wird in farblosen Kristallen erhalten, die beim Trocknen stets ein wenig violett gefärbt werden.

Schmelzpunkt: 319 bis 321°.

Das Äthylen löst sich in Alkalien mit schmutzig grüner Farbe. 1 g Tetramethoxytetraphenyläthylen liefert 0,3 g reines Tetraoxytetraphenyläthylen, das sind 33% der theoretischen Ausbeute.

U m s e t z u n g m i t T e t r a o x y t e t r a p h e n y l ä t h y l e n .

Der Umsatz des Äthylens mit Silberperchlorat und Ferrichlorid führt in Eisessig wie in Methanol zu den charakteristischen blau-violetten Farbstoffen. Die Farbe geht in beiden Fällen sehr bald nach rot, der Farbe des Säureabspaltungsproduktes zurück. (Formel siehe Seite 18) Spuren von Wasser bedingen einen wesentlich schnelleren Rückgang der Farbe. Ein festes Produkt kann wegen der sehr großen Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Verbindungen nicht erhalten werden.

Beim Umsatz mit Silbernitrat, Kupferchlorid und Kupferfulfat konnte nur das Säureabspaltungsprodukt beobachtet werden. Gerin- ges Erwärmen führte zur weiteren Zersetzung.

Der Umsatz mit Quecksilberchlorid führte zu keinem Ergebnis. Die Versuche mit Silberperchlorat und Silbernitrat ergaben eine Abscheidung von metallischem Silber.

Xanthon

wurde nach W. H. Perkin¹⁵⁾ aus Salicylsäure und Essigsäure anhydrid gewonnen.

Dixanthylen


wurde nach G u r g e n j a n z und v. K o s t a n e c k i¹⁶⁾ durch Reduktion des Xanthons mit Zinkstaub in Eisessig dargestellt.

15) B. 16, 339 (1883).

16) B. 28, 2310 (1895).

Umfetzungen mit Dixanthylen.

1.) Mit Silberperchlorat.



3,6 g Dixanthylen werden in Eisessig aufgeschlämmt und mit einer essigsauren Lösung von 4,2 g Silberperchlorat versetzt. Man erhitzt $\frac{1}{4}$ Stunde und erhält so einen roten Niederschlag, der abfiltriert und mit kaltem Eisessig gewaschen wird.

Der trockene Körper ist äußerst explosiv; sein Verpuffungspunkt liegt um 335° . Beim Glühen bleibt metallisches Silber zurück.

In kaltem Wasser ist der Körper unlöslich; in der Hitze tritt Zersetzung ein. Schwefelsäure und Salpetersäure lösen mit rot-oranger Farbe. Pyridin löst wenig mit roter Farbe. In den üblichen organischen Lösungsmitteln ist der Körper unlöslich.

Zur Analyse wurde die Substanz nochmals gereinigt, indem sie mit Xylol ausgekocht wurde.

Analyse:

0,0267 g Substanz verbrauchen (in HNO_3 gelöst) 0,69 ccm n/10
 0,0560 g Substanz verbrauchen (in HNO_3 gelöst) 1,46 ccm NaCl-
 0,0775 g Substanz verbrauchen (in HNO_3 gelöst) 2,00 ccm Lösung.

$\text{C}_{26}\text{H}_{16}\text{O}_6(\text{AgClO}_4)_2$	berechnet:	27,90% Ag
	gefunden:	27,85% Ag
		28,15% Ag
		27,90% Ag.


Der Umsatz von Dixanthylen mit Silberperchlorat wurde auch in trockenem Toluol vorgenommen. Es entstand ein braunes Produkt, das dieselben Eigenschaften zeigte, wie das in Eisessig erhaltene rote Produkt.

Analyse:

0,0427 g Substanz verbrauchen 1,10 ccm n/10 NaCl-Lösung.

$C_{26}H_{16}O_6(AgClO_4)_2$ berechnet: 27,90% Ag
 gefunden: 27,81% Ag.

2.) *Umsetzung mit Silbernitrat.*



Beim Umsatz von Dixanthylen mit Silbernitrat in Eisessig tritt beim Erwärmen erst eine Rotfärbung auf, die jedoch sehr bald unter Entwicklung nitroser Gase sich bis zum schwachen Gelb aufhellt. Aus dieser Lösung ist dann nur noch Xanthon zu isolieren. Auch ein Arbeiten bei Temperaturen von 60 bis 65°, wie W. Brunnert¹⁷⁾ sie zur Darstellung feines Dixanthylenitrats aus Dixanthylen und konz. Salpetersäure gebraucht, erweist sich als nicht gangbar, da auch hierbei eine Zersetzung unter Stickoxydentwicklung stattfindet.


Schüttelt man dagegen eine Aufschlämmung von 1 g Dixanthylen in kaltem Eisessig mit 5 g feinpulverisiertem Silbernitrat ein bis zwei Stunden, dann erhält man ohne Stickoxydentwicklung eine rote kristalline Substanz. Sie erweist sich unter dem Mikroskop jedoch nicht als einheitlich. Eine Reinigung ist nur möglich, indem man zuerst mit verdünnter Salpetersäure wäscht, um das überschüssige Silbernitrat zu entfernen, dann mit Chloroform behandelt, um nicht umgesetztes Äthylen auszuwaschen.

Der so erhaltene rote kristalline Körper ist rein; er enthält kein Silber. In den bekannten organischen Lösungsmitteln ist die Substanz unlöslich, z. T. tritt Zersetzung ein. Mineralsäuren lösen mit rot-oranger Farbe.

Analyse:

49,04 mg Substanz, 3,28 ccm N_2 , 753 m/m, 22°.
 $C_{26}H_{16}O_2(NO_3)_2 \cdot HNO_3$ berechnet: 7,68% N_2
 gefunden: 7,65% N_2 .

17) R. Wizinger und W. Brunnert, Dissertation Bonn 1930, 29.



0,8 g Silbernitrat werden in möglichst wenig Wasser gelöst und zu einer Aufschlämmung von 0,8 g Dixanthylen in 50 ccm Essigsäureanhydrid gegeben. Das Ganze wird bis zur eben beginnenden Reaktion schwach erwärmt, keinesfalls über 50° , da sonst Zersetzung eintritt, und dann etwa eine Viertelstunde kräftig geschüttelt. Das Äthylen nimmt so langsam eine von gelb über orange nach leuchtend-rot gehende Farbe an. Es wird filtriert und mit sehr viel Anhydrid gewaschen. Der erhaltene Körper ist silberhaltig. In den bekannten organischen Lösungsmitteln ist er unlöslich; Mineralfäuren lösen ihn mit orange-roter Farbe.

Analyse:


14,18 mg Substanz, 0,58 ccm N_2 , 759 m/m, 23° .

0,0537 g Substanz 0,0167 g Silber

$\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2(\text{AgNO}_3)_2$ berechnet: 4,00% N_2 ; 30,86% Ag.

gefunden: 4,51% N_2 ; 31,10% Ag.

3.) Umsetzung mit Ferrichlorid.



3,6 g Dixanthylen werden in 50 ccm Eisessig aufgeschlämmt und mit einer essigsäuren Lösung von 3,3 g subl. Ferrichlorid versetzt. Man erhitzt etwa 10 Minuten und kocht den erhaltenen roten Niederschlag zur Reinigung nochmals mit Eisessig aus. Das Doppelsalz wird abfiltriert und im Trockenschrank bei 100° solange getrocknet, bis kein Geruch nach Eisessig mehr wahrzunehmen ist.

Der Körper bildet leuchtend rote Kriställchen. Er beginnt sich


bei 260° zu zersetzen (unter Dunkelfärbung) und schmilzt bei 310 bis 315° .

In allen üblichen Lösungsmitteln ist die Substanz unlöslich, etwas löslich ist sie in verdünnter Salzsäure. In Alkohol wird sie zerfetzt.

Analyse:

0,0462 g Substanz	0,0703 g AgCl
0,0934 g Substanz	0,0192 g Fe_2O_3
$\text{C}_{26}\text{H}_{16}\text{O}_2(\text{FeCl}_4)_2$	berechnet: 37,57% Cl; 14,80% Fe.
	gefunden: 37,64% Cl; 14,08% Fe.

4.) Umsetzung mit Kupferchlorid.



0,9 g Dixanthylen werden in 25 ccm heißem Anisol gelöst und mit einer Lösung von 0,85 g kristallisiertem Kupferchlorid in Aceton versetzt. Es fällt sofort ein gelb-oranger Körper, der in allen üblichen organischen Lösungsmitteln unlöslich ist. Die Substanz erweist sich als kupferhaltig. Zur Analyse wird sie mit Aceton und Anisol zur Entfernung etwa nicht umgesetzter Ausgangsmaterialien ausgekocht.

Schmelzpunkt: 244° .

Analyse:

0,0541 g Substanz	0,0489 g AgCl
$\text{C}_{26}\text{H}_{16}\text{O}_2(\text{CuCl}_2)_2$	berechnet: 22,57% Cl
	gefunden: 22,36% Cl.

5.) Umsetzung mit Mercurichlorid.

Ein Umsatz des Äthylens mit Mercurichlorid wird nur erzielt, wenn man die beiden Komponenten zusammen erhitzt. Man erhält einen kirsch-roten Farbstoff, dessen Isolierung jedoch große Schwierigkeiten bereitet. Der Farbstoff ist nämlich nur in Anisol und Essig-

Säureanhydrid einigermaßen löslich, beides Lösungsmittel, die in der Hitze auch Mercurichlorid gut lösen. Der erhaltene Körper ist also stets in hohem Maße mit Mercurichlorid verunreinigt. Versuche, das Mercurichlorid durch Waschen, z. B. mit wässriger Kochsalzlösung zu entfernen, scheitern, da sich die Verbindung dabei zersetzt. Da außerdem bei der Darstellung eine weitgehende Zersetzung unter Abscheidung von Kohlenstoff eintritt, ist von der Isolierung des Körpers abgesehen worden.

Der Umsatz des Äthylens mit Kupfernitrat und Kupfersulfat führte zu keinem Ergebnis.

Thioxanthon


wurde aus Thiofalicylsäure mit Benzol und konzentrierter Schwefelsäure dargestellt.¹⁸⁾

Thiodixanthylen

wurde durch Reduktion des Thioxanthons in siedendem Eisessig mit Zinkstaub erhalten.¹⁹⁾

Umsetzungen mit Thiodixanthylen.

1.) Mit Silberperchlorat.



1 g Äthylen wird in heißem Anisol gelöst und mit einer Lösung von 1,1 g Silberperchlorat in heißem Anisol versetzt. Im Moment der Zugabe tritt eine schmutzig braune Farbe auf, die nach einigen Sekunden unter spontaner Silberabscheidung in ein Kirsch-rot übergeht. Man erhitzt noch kurze Zeit, filtriert vom ausgeschiedenen Silber ab und versetzt nach dem Erkalten bis zur auftretenden Trübung mit Äther. Aus diesem Gemisch kristallisieren innerhalb 48 Stunden schöne rote Kristalle. Sie können aus Anisol/Äther, aber

18) Journ. Chem. Soc. 97, II, 1296 (1910).

19) F. Mayer, B. 42, 1136 (1909); C. 1909, 1573.

R. Wizinger und W. Brunnert, Dissertation Bonn 1930, 43.


auch aus heißem Eisessig umkristallisiert werden.

Die Verbindung zersetzt sich in heißem Alkohol und Wasser. Eisessig, Anisol lösen gut, Toluol und Benzol Spuren mit kirchroter Farbe. Pyridin löst den Körper in der Kälte wie in der Hitze mit gelber Farbe.

Analyse:

0,0751 g Substanz	0,0361 g AgCl
$C_{26}H_{16}S_2(ClO_4)_2$ berechnet:	12,00% Cl
gefunden:	11,89% Cl.

2.) Mit Eisenchlorid.



1 g Äthylen wird in Chlorbenzol gelöst und in der Siedehitze mit 1 g subl. Ferrichlorid in 10 ccm Methanol veretzt. Es fällt sofort ein eisenhaltiger roter Niederschlag kristallin aus, der aus heißem Anisol unter Ätherzugabe umkristallisiert wird.

Die Verbindung löst sich in Wasser wenig unter Zerfetzung. In Alkohol tritt ebenfalls Zerfetzung ein. Eisessig löst wenig, Anisol gut mit rot-oranger Farbe. Spurenweise ist die Verbindung in Toluol und Benzol mit rot-oranger Farbe löslich. Pyridin löst in der Kälte wie in der Hitze mit gelber Farbe.

Analyse:

0,0474 g Substanz	0,0682 g AgCl
0,1326 g Substanz	0,0266 g Fe_2O_3
$C_{26}H_{16}S_2(FeCl_4)_2$ berechnet:	35,99% Cl; 14,21% Fe.
gefunden:	35,59% Cl; 14,03% Fe.

3.) Mit Kupferchlorid.

1 g Äthylen wird in 50 ccm Chlorbenzol gelöst und in der Siedehitze mit 0,8 g kristallisiertem Kupferchlorid in 10 ccm Aceton veretzt. Es fällt sofort ein violett-brauner Körper, der abfiltriert

und mit Chlorbenzol gewaschen wird. Die Substanz ist kupferhaltig; sie zersetzt sich beim Liegen an der Laborluft in wenigen Tagen. In fäktlichen Lösungsmitteln tritt Zerfetzung ein.

Analyse:

0,0238 g Substanz	0,0201 g AgCl
$C_{26}H_{16}S_2(CuCl_2)_2$ berechnet:	21,48% Cl
	gefunden: 20,89% Cl.

4.) *Mit Mercurichlorid.*

Mit Mercurichlorid konnte ein Umsatz mit dem Äthylen wie beim Dixanthylen ebenfalls nur durch Zusammenerhitzen der beiden Komponenten erzielt werden. Auch hier wird ein roter Farbstoff beobachtet, auf dessen Isolierung mit der beim Dixanthylen angegebenen Begründung verzichtet wurde.

Der Umsatz des Äthylens mit Silbernitrat, Kupfernitrat und Kupfersulfat führte zu keinem Ergebnis.

Lebenslauf.

Am 22. August 1911 wurde ich, Georg Läufer, als Sohn des Kaufmanns Georg Läufer und seiner Ehefrau geborene Riedel, in Bochum geboren. Ich bin arischer Abstammung und evangelischer Konfession.

Nach vierjährigem Besuche der Volksschule zu Bochum wurde ich Ostern 1921 in die Sexta der Goethe-Oberrealschule zu Bochum aufgenommen und erlangte dort Ostern 1930 das Zeugnis der Reife. Ich widmete mich alsdann an der Universität in Marburg a. L. (Sommer-Semester 1930 bis Winter-Semester 1931/32) und an der Universität in Bonn (Sommer-Semester 1932) dem Studium der Naturwissenschaften mit dem Ziel des Staatsexamens für Lehramtskandidaten. Im Winter-Semester 1932/33 begann ich an der nämlichen Universität das Studium der Chemie, legte dort im Sommer 1934 das erste Verbandsexamen und Ende 1935 das zweite Verbandsexamen bei Herrn Professor Dr. h.c. P. Pfeiffer ab. Mit der vorliegenden Dissertation begann ich im Januar 1936 unter Leitung des Herrn Professors Dr. R. Wizinger, und beendete deren experimentellen Teil im September 1937.

Zu Beginn des Winter-Semesters 1936/37 erhielt ich am Bonner chem. Institut eine Hilfsassistentur (Praktikum für Zahnmediziner), die ich bis zum Ende des Sommer-Semesters 1937 verwaltete.

Tag der mündlichen Prüfung 24. November 1937.
